

Calendrier annuel de floraison des plantes mellifères polynésiennes



Inflorescence de 'Apape (*Rhus taitensis*), arbre très visité en saison par les abeilles

Jean-François Butaud
Ingénieur forestier
Consultant en foresterie et botanique
BP 52832 Pirae 98716 Tahiti
Tel. (689) 40 43 17 56 / (689) 87 26 14 55
Email : jfbutaud@hotmail.com

N° Tahiti : 748 715 - N° R.C.S. : Papeete
TPI 05 1381 A

Avec la collaboration pour la mise en page
de **Franck Heimata Bertho** (Apps Tahiti).

Février 2020

Contexte

La chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) de la Polynésie française a mis en œuvre la création d'un calendrier annuel de floraison des plantes mellifères polynésiennes, afin de répondre à la demande de ses apiculteurs mais également de réaliser une synthèse des travaux scientifiques et des recensements déjà effectués par le passé. Pour ce faire, le prestataire en botanique polynésienne, Jean-François Butaud, a été contracté.

L'inventaire des plantes mellifères a été dressé à partir de l'étude de la bibliographie, d'enquêtes auprès d'apiculteurs et également d'observations personnelles du prestataire.

Pour chacune des 200 plantes principales, ont été précisés :

- Dénominations : nom latin officiel, principaux synonymes, noms français, noms polynésiens des différents aires géographiques
- Type biologique (arbre, arbuste, arbrisseau, liane, herbacée)
- Description succincte de chaque espèce et éléments de reconnaissance caractéristiques
- Statut biogéographique (endémique, indigène, introduction polynésienne, introduction moderne)
- Statuts réglementaire et officiel le cas échéant (espèces protégées, espèces menaçant la biodiversité, espèces menacées au sens de l'UICN)
- Degré de naturalisation pour les espèces introduites (cultivée, subspontanée, adventice, naturalisée, envahissante)
- Répartition en Polynésie française (présence / absence selon les zones) et abondance au sein de chacune des zones (très commun, commun, peu commun, rare, très rare)
- Ecologie de la plante (principales formations végétales regroupant substrat, altitude, climat, topographie, plantes caractéristiques et physionomie – forêt, fourré, lande... ; atoll, formations littorales, landes dégradées, forêt semi-sèche, forêt mésophile, forêt hygrophile de vallée, forêt hygrophile d'altitude, forêt ombrophile...)
- Intérêt de la plante pour les abeilles : pollen, nectar, miellat
- Phénologie de chaque plante, autrement dit ses mois de floraison
- Sources des données

Par ailleurs, deux photographies pour chacune des plantes ont été fournies.

L'ensemble de ces éléments, disponibles au sein d'un fichier numérique au format Excel, ont été mis en page de façon à disposer de fiches individuelles par plante au format Word, au format PDF et au format Power Point.

Par ailleurs, un rapport au format Word et au format PDF regroupant la méthodologie ainsi que l'ensemble des fiches a également été constitué ; il s'agit du présent document.

Enfin, une application interactive, permettant ergonomiquement et efficacement d'accéder aux informations précédentes, a été mise au point. Cette application comprend ainsi un formulaire dans lequel l'utilisateur peut préciser sa recherche dans tout ou partie des champs suivants :

- Zone géographique (10 zones),
- Type biologique (5 types),
- Nom de la plante (qu'il soit français, latin, tahitien, marquisien, synonyme...)
- Abondance (5 degrés d'abondance)
- Mois de floraison (12 possibilités)

A la suite de quoi, l'application affiche la liste des plantes correspondant aux critères de sélection rentrés. Ensuite, l'utilisateur peut cliquer sur le nom de plante pour accéder à la fiche (PDF ou Powerpoint) ou sur une miniature de la photographie pour accéder à la photographie en grande dimension puis à la fiche.

Ces restitutions ont été conçues de telle façon que les mises à jour peuvent être aisément intégrées aux fichiers Excel, Word ou Power Point ainsi qu'à l'application interactive.

Détail de la méthode de travail et mode d'emploi des fiches - espèces

Recensement des plantes mellifères

Près de 240 plantes ont été intégrées à la liste des plantes mellifères de Polynésie française à partir de l'étude de la bibliographie spécialisée relative à la Polynésie française ou d'observations personnelles de différentes personnes. D'autres plantes réputées mellifères en dehors de la Polynésie française et présentes dans les différentes îles polynésiennes n'ont pas été intégrées dans l'attente d'observations locales avérant leur fréquentation par les abeilles. Les travaux ayant servi à établir la liste de base sont cités en bibliographie. Nous nous proposons de commenter chacune des références ainsi citées :

Maclet, 1958 : il s'agit de la liste de plantes mellifères la plus ancienne avec 46 plantes recensées. Il faut noter que plusieurs des espèces citées sont aujourd'hui absentes de Polynésie tandis que d'autres ne sont que des curiosités botaniques.

Anonyme, non daté : ce bulletin technique du SDR non daté cite 63 plantes mellifères de Polynésie française tout en les illustrant ; ces plantes sont en partie celles de Maclet (1958) tandis que d'autres ont probablement été citées par des apiculteurs.

Fert & Pajuelo, 2013 : ce rapport reprend l'ensemble des espèces mellifères citées par Maclet (1958) ainsi que celles du bulletin et ajoute également plusieurs espèces citées comme mellifères à l'occasion de la visite en Polynésie des deux auteurs.

Oudart, 2015 : cette étude liste 133 plantes mellifères issues des propres observations de l'auteur au cours de deux mois de suivi de ruchers sur Tahiti mais également des observations de plusieurs apiculteurs.

Rogers, 2017 : cette étude comprenant des travaux de palynologie à partir de miels polynésiens et de plantes mellifères identifiées par les apiculteurs a inventorié 40 plantes en principe mellifères. Malheureusement, de nombreuses erreurs d'identification botanique des échantillons de plantes collectés par les apiculteurs ainsi que de détermination des pollens entachent sérieusement ces résultats ; aussi, peu de plantes mellifères nouvelles, non citées par les précédentes études, ont été intégrées à notre présente liste des plantes mellifères polynésiennes, faute de recoupement et de confiance dans l'étude.

Ramage, 2019 : l'entomologiste Thibault Ramage tient à jour la liste des plantes polynésiennes fréquentées par les abeilles à partir de ses propres observations mais également celles d'autres observateurs comme Frédéric Jacq et Jean-François Butaud ; cette liste qu'il a gracieusement mise à disposition comprenait ainsi 97 plantes en 2019.

Sélection des plantes à décrire

La sélection de 200 plantes à décrire au sein des 240 actuellement recensées a été effectuée grâce :

- au regroupement de différentes plantes très proches morphologiquement,
- à l'élimination de plantes de détermination douteuse ou au statut mellifère douteux,

- à la mise de côté de plantes très rares (curiosités botaniques...) ou dont la présence en Polynésie française est aujourd'hui douteuse.

La liste complète des 240 plantes recensées comme mellifères figure au sein d'un fichier numérique au format Excel fourni à la CAPL.

Noms scientifiques

Les noms scientifiques donnés sont les noms latins valides, officiels, à jour de la taxonomie et de la nomenclature. Ils sont tirés en grande partie de la base de données botaniques de Polynésie française Nadeaud (<http://nadeaud.ilm.pf/>) constituée par le botaniste taxonomiste Jacques Florence (IRD) et ont été confirmés ou infirmés par les autres bases de données en ligne comme l'Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle (INPN - <https://inpn.mnhn.fr/accueil/index>) et Plants of the World Online (<http://www.plantsoftheworldonline.org/>).

Synonymes

Les synonymes comprennent les noms cités dans la bibliographie liée aux plantes mellifères et qui ne sont pas les noms valides (erreurs d'identification ou synonymie botanique au sens strict) ainsi que les noms anciens et bien connus de certaines espèces mellifères. Ces synonymes proviennent des bases de données botaniques citées précédemment mais également de la correction d'erreurs d'identifications antérieures. Dans ce champ, ont également été intégrés les noms valides par lesquels les plantes ont été cités dans la littérature dans le cas où des regroupements d'espèces ont été réalisés.

Taxons concernés

Des regroupements de plantes ont été réalisés, uniquement pour des espèces morphologiquement proches appartenant au même genre, car difficiles à différencier pour les non-initiés. Ainsi, le champ « Taxons concernés » cite les espèces ayant été réunies en un unique taxon. De façon exhaustive, les regroupements réalisés ont été les suivants :

- *Abutilon* spp. regroupant *Abutilon grandifolium* et *A. hirtum*,
- *Ageratum* spp. regroupant *Ageratum conyzoides* et *A. houstonianum*,
- *Bidens* spp. regroupant *Bidens uapensis*, *Bidens polycephala* et les autres *Bidens* endémiques marquisiens,
- *Bougainvillea* spp. regroupant les différentes espèces de bougainvilliers comme *Bougainvillea spectabilis*, *B. x buttiana*, *B. glabra*,
- *Cassia javanica* regroupant les deux variétés citées,
- *Clerodendrum* spp. regroupant les *Clerodendrum* arbustifs à fleurs rouges *Clerodendrum buchananii* var. *fallax*, *C. paniculatum*,
- *Coffea* spp. regroupant *Coffea arabica* et *C. liberica*,
- *Cucurbita* spp. regroupant *Cucurbita pepo* et *C. maxima*,
- *Emilia* spp. regroupant *Emilia sonchifolia* et *E. fosbergii*,
- *Flacourtia* spp. regroupant *Flacourtia rukam* et *F. indica*,
- *Hyptis* spp. regroupant *Hyptis pectinata* et *H. capitata*,
- *Ludwigia* spp. regroupant *Ludwigia octovalvis* et *L. peruviana*,
- *Rosa* spp. regroupant les différents rosiers,
- *Tagetes* spp. regroupant *Tagetes patula* et *T. erecta*,
- *Weinmannia* spp. regroupant *Weinmannia parviflora*, *W. marquesana* et *W. rapensis*.

Famille botanique

La famille botanique est donnée pour chacune des plantes ou groupes de plantes et provient également des bases de données botaniques précitées. 70 familles botaniques sont ainsi concernées.

Type biologique

Chaque plante est caractérisée par son type biologique, les différentes possibilités étant :

- Arbre : végétal ligneux au tronc individualisé portant des branches à partir d'une hauteur notable ; mesurant généralement plus de 5 m de hauteur.
- Arbuste : petit arbre à tronc en général assez grêle, se ramifiant très rapidement à moins de 2 m de hauteur et au port assez tortueux ; mesurant généralement moins de 5 m de hauteur.
- Arbrisseau : plante ligneuse caractérisée par une tige ramifiée dès la base ou par plusieurs tiges naissant d'une souche commune ; mesurant généralement moins de 2 m de haut ; en principe facile à arracher à la main.
- Herbacée : plante frêle, non ligneuse, dont les parties aériennes meurent après fructification.
- Liane grimpante : plante généralement non ligneuse possédant une racine en pleine terre et une tige mesurant plusieurs mètres de long s'élançant en hauteur en s'accrochant sur la végétation alentours.
- Liane rampante : plante généralement non ligneuse possédant une racine en pleine terre et une tige mesurant plusieurs mètres de long rampant au sol.
- Sarmenteux : plante au port intermédiaire entre celui d'une liane et celui d'un arbuste, possédant une base ligneuse arbustive et des ramifications aux rameaux grimpants et lianescents.

Statut biogéographique

Chaque plante est caractérisée par son statut biogéographique en Polynésie française, statut caractérisant sa répartition naturelle au sein et en dehors de la Polynésie française, ou sa répartition modifiée par l'homme.

Ainsi, lorsque la plante est native à la Polynésie française, son origine étant liée aux courants marins, aux courants aériens ou à l'avifaune, elle peut y être :

- Indigène : natif d'une zone donnée, comme les plantes se développant naturellement sur une île avant l'arrivée de l'homme ; au sens strict, excluant les endémiques ; au sens large, comprenant les endémiques et les indigènes au sens strict, également appelée native.
- Endémique : plante propre à une région géographique donnée, d'aire souvent restreinte°; en l'occurrence la Polynésie orientale (Cook, Polynésie française & Pitcairn), la Polynésie française, un de ses archipels ou une de ses îles ; plante qui n'existe naturellement nulle part ailleurs au monde.

D'autres plantes ont été introduites par l'homme en Polynésie française et il faut alors distinguer les :

- Introductions polynésiennes : plantes transportées volontairement ou involontairement lors des migrations polynésiennes et introduites dans les différentes îles polynésiennes entre leur peuplement initial vers 800 après J.C. et l'arrivée des premiers navigateurs européens à la fin du 18^{ème} siècle. Une soixantaine d'espèces sont concernées.
- Introductions moderne : plantes introduites volontairement ou involontairement dans les différentes îles polynésiennes depuis l'arrivée des premiers navigateurs européens à la fin du 18^{ème} siècle. Plus de 2500 espèces sont concernées.

Degré de naturalisation

Les plantes introduites par l'homme peuvent être caractérisées par leur degré de naturalisation qui consiste en quelque sorte en leur degré d'indépendance ou de dépendance à l'homme. Ainsi, parmi les plantes introduites, il faut distinguer les plantes :

- Cultivées : il s'agit des plantes qui sont uniquement cultivées et qui ne se développent pas en dehors des cultures ou des plantations,
- Subspontanées : il s'agit, d'une plante introduite cultivée qui arrive à survivre sur place après abandon de la culture et même à se multiplier localement, mais sans se répandre spontanément comme le font les plantes naturalisées,
- Adventices : il s'agit des plantes introduites se reproduisant et se répandant naturellement dans les environnements modifiés et fréquentés par l'homme (zones habitées, cultures, bords de sentiers, de pistes, de routes...) ; autrement nommées mauvaises herbes ou rudérales,
- Naturalisées : il s'agit des plantes introduites se reproduisant et se répandant naturellement, indépendamment de l'homme, dans le milieu naturel.

Statut réglementaire

Le Code de l'Environnement de Polynésie française comprend deux listes de plantes réglementées :

- Les plantes menaçant la biodiversité, parfois appelées plantes envahissantes ou plantes nuisibles : cette liste comprend actuellement 39 espèces qu'il est interdit de planter, de disséminer, de vendre... et dont la destruction est encouragée.
- Les plantes protégées : il s'agit de la liste A et de la liste B qui comprennent ensemble près de 170 taxons (en prenant en compte synonymie, doublons, révisions botaniques) dont il est interdit de dégrader à la fois les pieds et les habitats naturels.

Ainsi, pour chaque espèce mellifère, le statut de plante protégée ou de plante menaçant la biodiversité est indiqué.

Statut UICN

La liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle s'appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces et de sous-espèces. Ces critères s'appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. En Polynésie française, un atelier a été organisé en 2015 afin d'évaluer l'ensemble des plantes endémiques (les plantes indigènes au sens strict n'ont ainsi pas fait l'objet d'évaluation) et ses résultats ont été validés et édités par l'UICN France et le MNHN (https://uicn.fr/wp-content/uploads/2015/12/Liste_rouge_Flore_vasculaire_endemique_de_Polynesie_francaise.pdf).

La statut UICN des plantes mellifères endémiques a donc été renseigné pour les différents taxons ou groupes de taxons, les différentes catégories étant les suivantes :

- LC : préoccupation mineure
- NT : quasi menacé
- VU : vulnérable
- EN : en danger d'extinction
- CR : en danger critique d'extinction

Ecologie

Pour chaque plante, une liste d'habitats préférentiels a été dressée, en tachant de prendre en compte le degré d'anthropisation (types d'activités humaines), l'altitude (basse, moyenne,

haute), la physionomie (lande, fourré, forêt) et la pluviométrie (xérophile = sec, mésophile = conditions moyennes, hygrophile = humide, ombrophile = de nuages). Cette liste est présentée ci-dessous :

- Zones habitées,
- Zones cultivées,
- Zone d'élevage bovin,
- Plantations forestières,
- Pistes agricoles et forestières,
- Forêt littorale,
- Fourré littoral,
- Lande littorale
- Lande sèche,
- Fourré sec,
- Forêt sèche,
- Fruticée de basse altitude,
- Fruticée de moyenne altitude,
- Fourré mésophile de basse altitude,
- Fourré mésophile de moyenne altitude,
- Forêt mésophile de basse altitude,
- Forêt mésophile de moyenne altitude,
- Forêt hygrophile de basse altitude,
- Forêt hygrophile de moyenne altitude,
- Forêt hygrophile d'altitude,
- Forêt de nuages

Archipels – Groupes d'îles

Dix aires géographiques ont été définies afin de prendre en compte au maximum les caractéristiques polynésiennes que sont l'éloignement des îles et des archipels les uns des autres, la diversité géomorphologique des îles (substrat, altitude), la climatologie (tropical sec aux Marquises, subtropical humide vers les Australes...), la végétation ou la biogéographie (présence ou absence de certaines plantes mellifères, abondance...) et la linguistique (plusieurs langues ou aires linguistiques distinctes).

Les aires définies ont ainsi été les suivantes :

- Îles du Vent
- Îles sous le Vent
- Australes Nord
- Rapa
- Atolls soulevés des Tuamotu (Makatea, Niau, Anaa)
- Tuamotu de l'Ouest (aire Mihiroa)
- Tuamotu du Centre (aires Tapuhoe, Vahitu)
- Tuamotu de l'Est (aires Napuka, Tupitimoake, Maragai)
- Gambier
- Marquises Nord
- Marquises Sud

Abondance

La présence et, le cas échéant, le degré d'abondance des plantes mellifères dans chaque groupe d'île ont été définis à partir des informations tirées des bases de données botaniques accessibles pertinentes (essentiellement <https://naturalhistory2.si.edu/botany/marquesasflora/> pour les

Marquises et base de données botaniques Nadeaud (<http://nadeaud.ilm.pf/>) pour l'ensemble de la Polynésie française) mais également des bases de données personnelles du prestataire. Lorsque la plante n'est pas présente dans une aire géographique, aucun degré d'abondance n'a été indiqué.

Ainsi, 5 degrés d'abondance ont été définis :

- Très commun : plantes dominantes de plusieurs formations végétales très répandues, souvent omniprésentes dans le paysage,
- Commun : plantes aisément observables dans certaines formations végétales, parfois dominantes localement,
- Peu commun : plantes restreintes à des formations végétales particulières ou peu répandues dans les différentes îles, jamais dominantes mais parfois localement banales,
- Rare : plantes présentes à l'état d'individus isolés dans quelques formations végétales, ne pouvant entrer de façon notable et régulière dans la composition des miels,
- Très rare : plantes connues uniquement sous la forme de quelques individus.

Intérêt de la plante pour l'abeille

Les abeilles fréquentent les plantes pour différents produits qui ont un impact sur la production de miel : le pollen, le nectar et le miellat (modifié d'après <https://www.domaine-chezelles.com>)° :

- Les plantes qui produisent du pollen (toutes les plantes à fleurs produisent du pollen, ce qui n'est pas le cas des fougères et autres mousses) sont visitées par les abeilles, qui récoltent le pollen au cours du butinage et le ramènent à la ruche sous forme de pelotes. Le pollen est une source essentielle de leur alimentation mais ce n'est pas à partir de lui que les abeilles produisent le miel.
- Le nectar est une substance sucrée sécrétée par certaines fleurs, généralement pour attirer les pollinisateurs. Toutes les plantes ne produisent pas de nectar. C'est du nectar qu'est issu le miel. Mais pas seulement... il existe une source d'approvisionnement complémentaire ou de remplacement pour les abeilles : le miellat.
- Le miellat est une substance sucrée que l'on doit aux pucerons ou cochenilles, qui sucent la sève des plantes et en rejettent une partie. Donc le miel est le fruit du travail des abeilles, à partir du nectar et/ou du miellat qu'elles récoltent.

Nous avons indiqué, quand l'information était disponible dans la littérature consultée, essentiellement Oudart (2015) et Suprin (2016), quelles étaient les cibles des abeilles pour les différentes espèces. Les informations disponibles étant lacunaires, de nombreux compléments, voire corrections, peuvent être réalisés dans cette rubrique.

Mois de floraison

Pour chaque plante, les mois de floraison ont été indiqués pour l'ensemble de la Polynésie française. Ces données proviennent à la fois du travail de Oudart (2015) mené en juin et juillet à Tahiti, des deux tomes existants de la Flore de la Polynésie française de Jacques Florence dans lesquels l'auteur indique les périodes de floraison, mais également des propres observations du prestataire lors de la conception du présent calendrier (juillet à décembre) mais également de ses notes antérieures.

Initialement, ce travail devait être réalisé pour chaque aire géographique mais, après analyse approfondie des données disponibles, cela n'a pas été possible pour les raisons suivantes :

- Manque de données pour plusieurs aires géographiques,
- Variabilité importante des périodes de floraison d'une année sur l'autre pour une même espèce au sein d'une aire géographique,

- Variabilité importante des périodes de floraison de différents pieds de la même espèce au sein d'une seule île, en fonction des individus ainsi que de la microtopographie et de l'altitude.

Noms français & noms anglais

Les noms vernaculaires français et anglais ont été recherchés pour les différentes plantes dans la littérature internationale et plus spécifiquement celle concernant les îles du Pacifique. Il faut noter que certaines plantes ne possèdent pas de noms français ou anglais et donc que ce champ reste parfois vide. Ce sont surtout les noms polynésiens qui sont connus et employés par les habitants de Polynésie française.

Noms polynésiens

Les noms vernaculaires polynésiens ont été donnés, quand ils existent, pour chaque plante et dans chacune des aires géographiques afin de permettre la reconnaissance et l'identification par le plus d'apiculteurs possibles. Ces noms proviennent de la bibliographie botanique et ethnobotanique (notamment des guides floristiques de la DIREN disponibles sur <https://www.service-public.pf/diren/partager/docs/>), des dictionnaires et autres lexiques des différentes langues polynésiennes, mais également de recueils effectués par le prestataire et encore non publiés.

Description

Des éléments de description botanique mais également plus largement des critères de reconnaissance et certains usages des plantes mellifères sont synthétisés dans le champ « Description ». Ils ont pour but de faciliter l'identification des plantes mellifères par les apiculteurs.

Photographies

Pour chacune des plantes ou des groupes de plantes, deux photographies sont disponibles afin de permettre le plus souvent une identification quasi-immédiate des plantes mellifères. Autant que possible des photos variées ont été fournies, en priorité les fleurs puis les feuilles, le port ou les fruits. Dans le cas des groupes de plantes, les photographies déclinent plutôt chacune des espèces concernées par le groupe. Toutes les photographies ont été prises par le prestataire Jean-François Butaud et sont mises à disposition de la CAPL pour la promotion de la filière apicole polynésienne. Pour tout autre usage, un accord de l'auteur, qui en demeure le propriétaire, doit être obtenu.

Sources

La présence de chaque plante dans la liste est étayée par la littérature polynésienne mais également par des observations personnelles du prestataire et de Marc Fabresse de la CAPL. Ainsi, l'ensemble des sources citant comme mellifère chacune des plantes sont citées, généralement sous la forme de l'auteur et de l'année (se référer à la bibliographie pour la citation complète de la source).

Remerciements

Nous tenons à remercier tout particulièrement Thibault Ramage et Kevin Besson pour leurs échanges de données sur les plantes mellifères ainsi que Marc Fabresse de la CAPL pour nous avoir fait confiance dans la bonne réalisation du calendrier de floraison des plantes mellifères polynésiennes.

Bibliographie

Anonyme. Non daté. L'apiculture en Polynésie française. Bulletin Technique. Département DEL, Service du Développement Rural. Polynésie française.

Fert G. & Pajuelo A.G. 2013. Mission d'audit de l'apiculture en Polynésie française. Rapport final. Polynésie française.

Maclet J.N. 1958. Liste préliminaire des plantes d'intérêt économique et des principales plantes adventices existant en Polynésie française. Section Documentation – Recherche, Service de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, n°47/AGRI/PE, Polynésie française.

Oudart H. 2015. Etude et référencement des plantes mellifères de Polynésie française : Etude d'un site dans la commune de Mahina, Tahiti. Département EEL, Service du Développement Rural. Polynésie française.

Ramage T. 2019. Extrait de sa base de données des pollinisateurs de Polynésie française – *Apis mellifera*.

Rogers K.M. 2017. Melissopalynologie et caractérisation physico-chimique des miels de la Polynésie Française. Lower Hutt (NZ): GNS Science. 171p. (GNS Science international consultancy report 2017/05F).

Suprin B. 2016. De fleur et en fleur. Guide des plantes mellifères en Nouvelle-Calédonie. Editions Photosynthèse, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Nom scientifique

Abutilon spp.

Malvacées

Synonymes

Taxons concernés

Abutilon hirtum, *Abutilon grandifolium*

Noms français

abutilon

Noms anglais

mallow

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Abutilon spp.

Feuilles orbiculaires très poilues et aux marges dentées ; fleurs comportant 5 à 6 pétales jaunes et à la base parfois pourpre ; nombreuses graines au sein d'un fruit sec.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

puehu, kaepu

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Adenanthera pavonina

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

cardinalier

Noms anglais

coralwood, red sandalwood, red-beadtree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, zones cultivées, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
			X

Adenanthera pavonina

Feuilles composées bipennées possédant généralement une cinquantaine de folioles ; inflorescences comportant des dizaines de fleurs jaunes ; gousses réunissant des dizaines de graines rouges comestibles et souvent employées dans les colliers ; bois de qualité moyenne éclatant en séchant.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Oudart (2015), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Commun	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pitipiti'o, pitipiti'o pukiki, poniu hao'e	pitipiti'o, pitipiti'o pukiki	pitipiti'o popa'a, pipiti'o popa'a
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pitipiti'o popa'a, pipiti'o popa'a	paina
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	pitipiti'o popa'a	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Adonidia merrillii

Arécacées

Synonymes

Veitchia merrillii

Taxons concernés



Noms français

palmier Paul et Virginie,
palmier de Noël

Noms anglais

Manila palm, Christmas
palm

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Adonidia merrillii

Palmier caractérisé par une gaine verte moyennement longue et des grappes comportant de nombreux fruits d'un rouge éclatant ; usage essentiellement ornemental.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Rare

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Rare

Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Ageratum spp.

Astéracées

Synonymes

Ageratum houstonianum

Taxons concernés

Ageratum houstonianum,
Ageratum conyzoides



Noms français

agérate bleue, herbe à
bouc

Noms anglais

billygoat weed

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées, zones d'élevage
bovin, forêt hygrophile de
moyenne altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Ageratum spp.

Composée aux feuilles poilues et odorantes ; inflorescences bleues à violettes ; peut atteindre 1 m de hauteur en conditions humides et abritées, et alors former des massifs denses très couvrants et exclusifs ; appréciée en cosmétique pour l'odeur de son feuillage, elle fait partie des ingrédients des petits bouquets parfumés marquisiens.

Nectar Pollen Miellat

X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mei'e rore, mei'e	putara, mei'e	maire vaihi, maige vaihi
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
taruruveve	maire vaihi	maire vaihi
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kakakameika, kakakameika		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français

albizia chinois, albizia rose

Noms anglais

Chinese albizia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Plantations forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Albizia chinensis

Grand arbre proche du Falcata et s'en différenciant par des jeunes feuilles et des grandes stipules rougeâtres ; planté pour la restauration des sols mais également pour son bois relativement durable comparativement au précédent.

Nectar Pollen Miellat

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Très rare

Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

ra'au marumaru

ra'au marumaru

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

paina

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Albizia lebbbeck

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

bois noir d'Haïti, lebbbeck

Noms anglais

Siris tree, Lebbek tree, East Indian walnut

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Plantations forestières, zones habitées, forêt mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Albizia lebbbeck

Arbre caractérisé par ses fleurs aux nombreuses étamines jaunâtres et ses gousses aplaties beiges à maturité ; bois de cœur de couleur noire et assez durable parfois employé en menuiserie et ébénisterie.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Oudart (2015), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun		

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
marumaru	kokorohi	tiga 'uo'uo

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
rakau papa'a	faifai papa'a, ra'au marumaru	faifai papa'a, ra'au marumaru

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
paina		

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Aleurites moluccanus

Euphorbiacées

Synonymes

Aleurites moluccana

Taxons concernés



Noms français

bancoulier

Noms anglais

candlenut tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Aleurites moluccanus

Atteignant plus de 20 m de hauteur et 1,5 m de diamètre, à écorce lisse et grise ; feuilles présentant de 3 à 5 lobes, blanchâtres à proximité des inflorescences ; nombreuses petites fleurs blanches formant les fruits contenant les fameuses noix de bancoul dont la suie était employée comme encre pour le tatouage et qui servaient également pour confectionner des bougies ; autrefois employé en médecine traditionnelle ainsi que pour produire une teinture.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
'ama	'ama	ti'a'iri, tuitui
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
ti'a'iri, tuitui	ti'a'iri, tuiui	ti'a'iri, tuiui
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
rama	ti'a'iri, tuiui	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Alyxia stellata

Apocynacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

alyxia

Noms anglais

alyxia

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile d'altitude, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Alyxia stellata

Arbuste aux branches parfois retombantes, doté d'un latex blanc, aux feuilles entières souvent verticillées par 3, aux petites fleurs blanches odorantes ; écorce odorante employée pour parfumer le monoï ; il s'agit du maire originel (et non de la fougère tahitienne du même nom) connu et employé pour son odeur dans l'ensemble du Pacifique.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mei'e	mei'e, mei'e papa	'atai, maige 'atai
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
maire rakau	maire mono'i, maire	maire mono'i, maire
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
meire		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Noms français

amaranthe, épinard

Noms anglais

amaranth, pigweed

- Type biologique
- Herbacée
- Statut biogéographique
- Introduction moderne
- Degré de naturalisation
- Naturalisée
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
- Zones habitées, zones cultivées, lande sèche

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat

Amaranthus spp.

Herbe charnue à la tige verdâtre à brunâtre, souvent prostrée et ne dépassant pas 50 cm de hauteur dans les meilleures conditions ; plusieurs amaranthes aux tiges vertes ou rouges, rampantes ou dressées se développent dans les friches, les jachères ou les champs cultivés ; dotées de fleurs minuscules, leurs feuilles sont comestibles comme des épinards dans de nombreux pays asiatiques et océaniques ; plantes essentiellement médicinales en Polynésie française.


Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
upokotiki	upo'oti'i, po'oti'i	upo'oti'i
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	upo'oti'i	vahineara'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	upo'oti'i	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français

ananas

Noms anglais

pineapple

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X			

Ananas comosus

Plante monocaule aux feuilles allongées épineuses et développant de nombreux rejets, fleurs violettes protégées par des bractées épineuses, infrutescence sous la forme d'un fruit multiple charnu comestible de couleur jaune à orange ; plante alimentaire et cosmétique pour son fruit, mais également recherchée pour la fibre des cultivars à longues feuilles appréciée en tissage.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES


ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ha'a ho'a, ha'a hoka	fa'a hoka	painapo, painapa
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
painapo	painapo, fara papa'a	painapo, fara papa'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
anana	painapo	painapo
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
painapo	painapo	





Noms français

liane corail

Noms anglais

coral vine

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Antigonon leptopus

Feuilles gaufrées en forme de cœur ; fleurs à 5 lobes roses ; présence de vrilles permettant de s'arrimer à la végétation alentours ; liane essentiellement ornementale.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Oudart (2015), Bull.Tech., Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare Peu commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

pohue to'a pohue to'a

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique	<i>Artocarpus altilis</i>	Moracées
Synonymes		
Taxons concernés		



Noms français

arbre à pain

Noms anglais

breadfruit tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, zones cultivées, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Artocarpus altilis

Arbre atteignant près de 25 m de hauteur, aux grandes feuilles coriaces plus ou moins lobées et renfermant un latex blanchâtre ; inflorescences mâles sous forme de cylindre allongé ; inflorescences femelles formant sans fécondation des fruits globuleux de plusieurs kilogrammes généralement dépourvus de graines ; plante alimentaire par excellence, également employée pour son bois, pour son écorce battue en tapa et pour ses vertus médicinales.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mei	me'i	'uru, 'ugu, maïore
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
'uru	'uru, maïore	'uru, maïore
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
mei, tumei	'uru, kuru	'uru
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'uru, kuru	'uru, kuru	

Nom scientifique

*Asparagus
setaceus*

Asparagacées

Synonymes

Asparagus plumosus

Taxons concernés



Noms français

asparagus

Noms anglais

asparagus

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, forêt
mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC

Asparagus setaceus

Asperge ornementale à la tige plus ou moins épineuse et aux feuilles linéaires très courtes et étroites ; fleurs à 6 lobes blanchâtres ; fruits globuleux noirs à maturité et disséminés par les oiseaux frugivores

Nectar Pollen Miellat

X X

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Rare Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Très rare Rare Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très rare Très rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Asystasia gangetica

Acanthacées

Synonymes

Taxons concernés

Asystasia gangetica subsp. *micrantha*, *Asystasia gangetica* subsp. *gangetica*

Noms français

asystasia

Noms anglais

Chinese violet,
coromandel

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Asystasia gangetica

Herbe plus ou moins rampante aux feuilles opposées ovales ; inflorescences terminales aux fleurs campanulées comprenant 5 lobes inégaux ; tube blanc à jaunâtre ; lobes blancs, violets ou roses ; plante parfois alimentaire, plus souvent ornementale, mais aujourd'hui en cours de naturalisation.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Oudart (2015), Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord
Peu commun Peu commun Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent
Commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest
Rare Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Averrhoa
carambola

Oxalidacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

carambolier

Noms anglais

star fruit, carambola

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Averrhoa carambola

Arbre atteignant une dizaine de mètres de haut, à l'écorce grise et lisse ; feuilles composées par plus d'une dizaine de folioles alternes ; fleurs à 5 pétales rosâtres lavés de violet ; fruit comestible jaune à maturité arborant une forme d'étoile à 5 branches ; cultivé pour son fruit et dont plusieurs cultivars plus ou moins sucrés sont connus.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS


Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
----------------	---------------	----------------

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	raparapa	raparapa

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------





Barringtonia asiatica

Noms français
bonnet d'évêque

Noms anglais
fish-poison tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Grand arbre trapu atteignant plus de 20 m de haut et 1 m de diamètre, aux grandes feuilles alternes, simples, obovales et brillantes de 35 cm de long sur 15 cm de large, à marge entière ; inflorescences regroupant une dizaine de fleurs dotées de 4 pétales blancs de 6 à 10 cm de long et de centaines d'étamines charnues blanches et roses vers l'apex dépassant 10 cm de long ; fruit correspondant à une drupe verte ovoïde à 4 angles, fibreuse, de plus de 10 cm de long sur 8 cm de large, en forme de bonnet de prêtre et renfermant une unique amande employée en médecine traditionnelle et entourée de fibres assurant sa flottabilité. Connu pour les propriétés ichtyotoxiques mais également médicinales de son amande ; bois employé pour les pirogues et la construction.

Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Très rare	Très rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
hutu	hutu	hutu, hotu, 'utu
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
hotu	hutu, hotu	hutu, hotu
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
'utu	hutu, hotu	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Barringtonia edulis

Lécythidacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

navelle, velle, noix navelée

Noms anglais

cutnut

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	

Barringtonia edulis

Feuilles longues et obovales aux marges récurvées ; fleurs réunies par dizaines au sein de longues inflorescences pendantes, comportant plusieurs dizaines d'étamines jaunes chacune ; fruits globuleux, violet foncé à maturité, comprenant une amande comestible ; arbre cultivé pour son amande comestible mais aussi pour son port ornemental et son inflorescence spectaculaire.

Nectar	Pollen	Miellat
--------	--------	---------

Riki Wong Yen, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Très rare

Rare

Très rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Bauhinia monandra

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français
arbre à orchidées

Noms anglais
butterfly-flower

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Bauhinia monandra

Petit arbre utilisé anciennement comme tuteur pour les vanilliers et aujourd'hui essentiellement ornemental ; feuilles possédant deux lobes arrondies ; fleurs à 5 pétales roses tâchetés de rouge et une unique étamine ; fruits sous la forme de gousses allongées et aplaties.

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pine	pine	hepene, pine

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pine	heipene, hepene

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pine	pine	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------





Noms français

piquant noir

Noms anglais

beggar's-tick, Spanish needles

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, zones d'élevage bovin, lande sèche

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Bidens pilosa

Feuilles ovales dentées ; inflorescences terminales comportant essentiellement des dizaines de fleurs en tube jaunes, et parfois quelques courtes fleurs en languette blanchâtres ; fruits sous la forme d'akènes s'accrochant facilement aux habits ; mauvaise herbe commune.

Nectar	Pollen	Miellat

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Peu commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ti		piripiri, pitipiti, pigipigi, pipiri, ta'amanamana
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
rau, nau	piripiri	piripiri
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
taru		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Bidens spp.

Astéracées

Synonymes

Taxons concernés

Bidens polycephala, *Bidens uapensis*, *Bidens* endémiques marquisiens

Noms français

bidens marquisien

Noms anglais

Polynesian bidens

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Endémique des Marquises

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC - VU

Ecologie

Lande sèche, fruticée de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Bidens spp.

Arbrisseaux endémiques, relativement communs aux Marquises, pouvant atteindre plus de 1,5 m de haut et 2 cm de diamètre, possédant des feuilles opposées, simples, elliptiques à lancéolées, subcoriaces, de 3 à 8,5 cm de long sur 1 à 4 cm de large, à marges dentées, des inflorescences aux nombreuses fleurs en tube et aux quelques fleurs en languette, plus ou moins longues, de couleur jaune ; fruits secs sous la forme d'akènes linéaires noirs à maturité, de 3 à 5 mm de long sur 0,5 mm de large, dotés de 2 arêtes s'accrochant peu efficacement aux habits.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

nihonihokio'e, pua
'ena'ena, heato
nihonihokio'e,
pua kio'e, tutae
kio'e

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Nom scientifique

Bignonia magnifica

Bignoniacées

Synonymes

Saritaeta magnifica

Taxons concernés



Noms français

bignone

Noms anglais

purple bignonia, purple funnel vine

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Bignonia magnifica

Feuilles opposées, composées de 2 folioles ovales ; fleurs campanulées de couleur violette, dotées de 5 lobes ; intérieur du tube de la corolle blanc rayé de violet ; liane ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Bougainvillea
spp.

Nyctaginacées

Synonymes

Taxons concernés

Bougainvillea spectabilis,
Bougainvillea x buttiana,
Bougainvillea glabra



Noms français

bougainvillier,
bougainvillées

Noms anglais

bougainvillea

Type biologique

Sarmenteux

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Bougainvillea spp.

Plante sarmenteuse atteignant 6 m de haut, aux rameaux épineux retombants ; feuilles ovales ; fleurs en tube dotées de 4 à 6 lobes blanchâtres, masquées par des bractées diversement colorées, pourpres, magenta ou mauves ; aucun fruit formé ; plante ornementale cultivée pour ses bractées diversement colorées et son port sarmenteux permettant la réalisation de tonnelles.

Nectar Pollen Miellat

Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		tataga'amoā

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tiare Putaviri	tiare Putaviri

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Cajanus cajan

Fabacées

Synonymes

Cajanus indicus

Taxons concernés



Noms français

pois d'Angole, ambrévade

Noms anglais

pigeon pea

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X		
SEP	OCT	NOV	DEC

Cajanus cajan

Feuilles alternes trifoliées ; corolle papilionacée à 5 pétales jaunes ; fruit sous la forme d'une gousse brune à maturité, à travers laquelle les graines comestibles apparaissent en relief ; essentiellement cultivé pour ses graines comestibles.

Nectar Pollen Miellat

X X

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

pipi

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AQUACULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Calliandra surinamensis

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

pompon de marin rose

Noms anglais

pink powderpuff

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Calliandra surinamensis

Atteignant jusqu'à 6 m de haut, au port tabulaire, doté de feuilles bipennées comprenant uniquement deux pennes et quelques dizaines de folioles de petites dimensions ; inflorescences denses, regroupant plusieurs fleurs dotées de nombreuses étamines blanches et lavées de rose aux extrémités ; fruits sous la forme d'une gousse ; cultivé dans les jardins comme arbuste ornemental pour son port caractéristique, son feuillage délicat et ses fleurs aux étamines bicolores.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Très rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Très rare

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

*Calophyllum
inophyllum*

Calophyllacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

laurier d'Alexandrie

Noms anglais

Alexandrian laurel

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Calophyllum inophyllum

Atteignant 20 m de haut et 2 m de diamètre, aux feuilles entières, coriaces, brillantes et elliptiques renfermant un latex jaune pâle ; fleurs blanches comprenant des dizaines d'étamines jaunes ; fruits globuleux, verts puis bruns à maturité, contenant une noix adaptée à la flottaison et une grosse amande ; réputé pour son bois durable ainsi que pour les propriétés médicinales et notamment cicatrisantes de son écorce, de ses feuilles et surtout de son amande ; ses fleurs parfumaient le monoï.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Oudart (2015), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Rare	Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
temanu	temanu	tamanu, 'ati

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tamanu	tamanu, 'ati	tamanu, 'ati

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tamanu	tamanu, 'ati	tamanu, 'ati

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
tamanu, 'ati	tamanu, 'ati



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Canarium indicum

Burséracées

Synonymes

Canarium commune

Taxons concernés



Noms français

noix de mission, noyer de la mission, amandier de Java

Noms anglais

pinut, java moutain almond

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Canarium indicum

Grand arbre doté de feuilles imparipennées se divisant en une dizaine de folioles ; fleurs verdâtres à jaunâtres réunies par quelques dizaines au sein d'inflorescences terminales ; fruit bleu foncé à noir à maturité, renfermant une solide noix contenant une à trois amandes comestibles ; cultivé pour ses amandes comestibles mais également pour son bois de très bonne qualité.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

noa

noa

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Carica papaya

Caricacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

papayer

Noms anglais

papaya, pawpaw

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Carica papaya

Tronc creux et charnu pouvant dépasser 10 m de hauteur ; espèce dioïque et se déclinant donc en pieds femelles et pieds mâles séparés ; grandes feuilles au limbe très découpé et porté par un pétiole tubulaire creux ; fleurs jaunâtres solitaires et collées au tronc (pied femelle) ou réunies en inflorescences portées par de longs pédoncules (pied mâle) ; fruit sous la forme d'une baie orange à maturité et comprenant plusieurs dizaines de graines globuleuses ; son fruit est comestible vert ou mûr, sa sève et ses feuilles sont médicinales tandis que son pétiole sert parfois de sarbacane.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Oudart (2015)

SOURCES

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
vi 'enana, vi papai	vi, vi papai, kiki'e	'i'ita, pagaoa
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'i'ita, ninita	'i'ita, ninita
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
ninita	'i'ita	'i'ita
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'i'ita	'i'ita	



Nom scientifique

Cassia grandis

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

cassia géant, cassie rose

Noms anglais

coral shower, horse cassia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Cassia grandis

Atteignant plus de 20 m de haut et 60 cm de diamètre ; feuilles paripennées divisées en 10 à 20 paires de folioles elliptiques ; fleurs réunies en inflorescences longues de 10 à 20 cm et comprenant plusieurs dizaines de fleurs au calice rouge et à la corolle rose composée de 5 pétales ; gousses cylindriques longues de 20 à 40 cm sur 3 à 5 cm de diamètre et comprenant 20 à 40 graines elliptiques. Ornementale.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Très rare

Très rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

pa'o'o pi'au

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Cassia javanica

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

casse de Java, cassia rose

Noms anglais

pink shower, Java cassia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cassia javanica

Atteignant 20 m de haut et plus de 40 cm de diamètre ; feuilles alternes paripennées divisées en 8 à 17 paires de folioles longues de 2 à 8 cm ; inflorescences comprenant plusieurs dizaines de fleurs dotées de 5 pétales roses à carmin longs de 2 à 3,5 cm ; gousse longue de 20 à 70 cm sur 1 à 2 cm de large. Introduit pour ses floraisons ornementales.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X

X

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

puanuanua

puanuanua

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

*Casuarina
equisetifolia
subsp.
equisetifolia*

Casuarinacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

bois de fer

Noms anglais

ironwood

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche,
zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Casuarina equisetifolia subsp. *equisetifolia*

Grand arbre atteignant 30 m de hauteur, caractérisé par ses rameaux rappelant les aiguilles de résineux, aux feuilles minuscules portées par des tiges vertes tubulaires ; fleurs mâles et fleurs femelles sous la forme de châtons ; fruit sous la forme d'un cône séchant et s'ouvrant à maturité en libérant les graines millimétriques. Réputé pour son bois très dense employé dans la confection des lances ou de divers ustensiles ; utilisé en médecine traditionnelle.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
toa	toa	toa, 'aito
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
toa, 'aito	'aito, toa	'aito, toa
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
toa, 'aito	'aito, toa	'aito
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'aito, toa	'aito	



Nom scientifique

Catharanthus roseus

Apocynacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

pervenche de Madagascar

Noms anglais

rosy periwinkle

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Catharanthus roseus

Plante de 50 à 80 cm de haut aux feuilles entières elliptiques courtement pétiolées et produisant un latex blanc ; fleur à 5 pétales blancs à roses en hélice avec un cœur rougeâtre ; cultivé pour ses fleurs ornementales.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
prevai	tihapai	pipitai 'ute'ute
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tihapai, tiare menema	tihapai, tiare menema
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Peu commun

Tuamotu Est

Peu commun



Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Nom scientifique

Ceiba pentandra

Malvacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

kapokier, cotonnier, fromager

Noms anglais

kapok tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Ceiba pentandra

Dépassant 25 m de hauteur, doté de grosses épines sur le tronc, aux feuilles composées, aux fleurs pendantes dotées de 5 pétales crème et 5 étamines, et aux fruits produisant en abondance du coton autour des graines. Cultivé pour son coton afin de confectionner matelas, coussins et oreillers ; aujourd'hui peu utilisé mais très esthétique dans le paysage.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Rare	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare		

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pupuru, 'uru'uru, 'u'uru	'uru'uru	paina, vavai
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'uru'uru, vavai papa'a	'uru'uru, vavai papa'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
komiro, koumiro	vavai papa'a	vavai papa'a
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
vavai papa'a		



Nom scientifique

Chrysobalanus
icaco

Chrysobalanacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

prunier-coton, icaquier,
coconette, pomme-
icaque

Noms anglais

coco plum, icaco, fat-pork

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Fourré hygrophile de basse
et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Chrysobalanus icaco

Atteignant 1 à 6 m ; feuilles simples, ovales à elliptiques, de 3 à 10 cm de long, coriaces et brillantes ; fleurs blanches de 5 mm regroupées en courtes inflorescences ; fruit charnu globuleux de 2 à 4 cm de diamètre, rose violacé à maturité. Introduit comme curiosité pour son fruit comestible.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Très rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

manini 'uru'uru

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Citrullus lanatus

Cucurbitacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

pastèque, melon d'eau

Noms anglais

watermelon

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Citrullus lanatus

Liane rampante atteignant plusieurs mètres ; feuilles longues de 5 à 30 cm et profondément divisées ; présence de vrilles ; fleurs jaunes de 4 cm de diamètre divisées en 5 lobes ; fruit vert rond à oblong jusqu'à 60 cm de diamètre, à pulpe rouge, jaune ou verdâtre.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mereni, katiu vai	mereni, katiu vai	mereni
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	mereni	mereni
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
mereti	mereni	mereni
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
mereni	mereni	



Nom scientifique

Citrus aurantiifolia

Rutacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

limetier, citronnier tahitien

Noms anglais

Tahitian lime

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Citrus aurantiifolia

Buisson épineux aux branches flexibles, difficilement pénétrable si il n'est pas taillé, pouvant atteindre près de 5 m de hauteur et produisant des citrons d'environ 5 cm de long renfermant plusieurs graines. Un ingrédient irremplaçable de la cuisine tahitienne actuelle mais qui est aussi largement utilisé dans la pharmacopée polynésienne.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
hitoro	fitoro	taporo, tapogo
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	taporo	taporo
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
taporo	taporo	taporo
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
taporo	taporo	



Nom scientifique

Citrus aurantium

Rutacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

bigaradier, oranger amer

Noms anglais

bitter orange

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, forêt
hygrophile de moyenne
altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC

Citrus aurantium

Atteignant plus de 6 m de haut et 30 cm de diamètre, doté d'épines sur les rameaux ; pétiole ailé ; limbe ovale à elliptique ; fleurs très odorantes par groupes de 1 à 6 aux pétales blancs et dotées de 20 à 25 étamines ; fruit globuleux de 5 à 9 cm de diamètre, orange à vert jaune à maturité, à la pulpe amère. Introduit pour son fruit comestible.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

'anani kava

'anani kava

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

'anani 'ava'ava

'anani 'ava'ava

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

pikarete,
pikaretie

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAOONAIRES
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Citrus grandis

Rutacées

Synonymes

Citrus maxima

Taxons concernés



Noms français

pamplemoussier doux

Noms anglais

pummelo

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Citrus grandis

Atteignant 5 à 8 m de haut et 30 cm de diamètre, doté d'épines sur les rameaux ; pétiole largement ailé ; limbe long de 10 à 20 cm, ovale ; fleurs très odorantes par petits groupes de 20 à 25 mm de long, aux pétales larges et blancs et dotées de 20 à 25 étamines ; fruit globuleux de 12 à 30 cm de diamètre, vert-jaune à maturité. Introduit pour son fruit comestible très apprécié.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		'anani popa'a
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'anani papa'a	'anani papa'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	'anani papa'a	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français
mandarinier

Noms anglais
mandarin

Type biologique
Arbuste

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Citrus reticulata

Atteignant 6 m de haut doté de rares épines ; feuilles simples, entières, longues de 8 cm au pétiole légèrement ailé ; fleurs blanches odorantes réunies au sein de courtes inflorescences ; fruit sphérique légèrement aplati, orange à maturité, de 5 à 9 cm de diamètre, doté d'une pulpe orange sucrée. Introduit pour son fruit comestible.

Nectar	Pollen	Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Très rare	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'anani pa'avete	'anani pa'avete

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

Nom scientifique

Citrus x sinensis

Rutacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

oranger, oranger doux

Noms anglais

orange

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC

Citrus x sinensis

Atteignant 15 m de hauteur, aux rameaux épineux ; pétiole sillonné ou à peine ailé ; fruit rond vert ou orange à maturité, à la chair sucrée. Très apprécié pour ses fruits comestibles juteux et sucrés ; feuilles et jeunes pousses parfois employées en médecine traditionnelle.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Très rare	Très rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
'anani	'anani	'anani
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
'anani	'anani	'anani
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
oragi	'anani	'anani
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'anani	'anani	



Nom scientifique

Clerodendrum
spp.

Lamiacées

Synonymes

Taxons concernés

Clerodendrum buchananii
var. *fallax*, *Clerodendrum*
paniculatum

Noms français

fleur pagode

Noms anglais

pagoda flower

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Clerodendrum spp.

Atteignant 3 m de haut ; feuilles opposées au limbe ovale à suborbiculaire, de 4 à 20 cm de long sur 7 à 20 cm de large, entier ou présentant 5 à 7 lobes selon les espèces ; inflorescences longues jusqu'à 45 cm et comprenant des dizaines de fleurs rouges à orange-rouge ; fruit sous la forme d'une drupe charnue sombre à maturité.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019), Butaud, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord
Peu commun Peu commun Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent
Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest
Peu commun Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Clerodendrum x speciosum

Lamiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

clérodendron grimpant

Noms anglais

pink bleeding-heart

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Clerodendrum x speciosum

Liane grimpante plus ou moins ligneuse atteignant au moins 4 m de long ; feuilles opposées longues de 10 à 17 cm et larges de 3 à 7 cm, elliptiques à ovales ; inflorescences comprenant 8 à 20 fleurs ; fleurs dotées d'un calice rose à 5 dents et d'une corolle rouge à 5 lobes ; fruits non formés.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Rare Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare Rare Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très rare Très rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Coccoloba uvifera

Polygonacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

raisinier de bord de mer,
raisin de mer

Noms anglais

seagrape

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Coccoloba uvifera

Dépassant 12 m de hauteur, à l'écorce gris rosé, aux feuilles rondes et coriaces, et aux fruits réunis en grappes et rouges à maturité. Cultivé pour ses fruits comestibles, pour son bois assez durable mais aussi pour son port ornemental et sa résistance aux conditions difficiles des littoraux rocheux.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
vino tai	vino tai	vine, vine miti, vine tatahi, vine tata'i
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
vine tatahi	vine tatahi	vine tatahi
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
vine	vine tatahi	vine tatahi
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
vine tatahi	vine tatahi	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Noms français
cocotier

Noms anglais
coconut tree

Type biologique
Arbre

Statut biogéographique
Introduction polynésienne

Degré de naturalisation
Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones habitées, zones agricoles, cocoteraies

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	X

Cocos nucifera

Palmier le plus commun de Polynésie, atteignant jusqu'à 30 m de haut et 40 cm de diamètre, caractérisé par ses longues palmes pennées une fois, de 4 à 6 m de long, dotées d'une centaine de pennes de 60 à 90 cm de long sur 5 cm de large ; inflorescences comprenant des plusieurs centaines de fleurs, quelques dizaines de fleurs femelles jaunâtres de 3 à 5 mm de long à la base et quelques centaines de fleurs mâles blanchâtres de 5 à 8 mm de long aux extrémités ; fruits ronds, ovales ou elliptiques, pouvant dépasser 30 cm de long à peau verte ou orange à maturité, comprenant la noix de coco, dotée d'une

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très commun	Très commun	Commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Très commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Très commun	Très commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Très commun	Très commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
'ehi	e'ehi	ha'ari, 'a'ari, ha'agi

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
ha'ari	ha'ari	ha'ari

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
ere'i	ha'ari, hakari	ha'ari

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
hakari, niu	hakari, niu



Nom scientifique

*Codiaeum
variegatum* var.
variegatum

Euphorbiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

croton

Noms anglais

variegated croton

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Codiaeum variegatum var. *variegatum*

Pouvant atteindre 6 m de haut, à la sève abondante, aux feuilles très variables et aux inflorescences vertes de 15 à 25 cm de long. Plante ornementale pour ses feuilles de formes et de couleurs très diversifiées, souvent plantée en haie ou le long des sentiers.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	ra'au purepure	ra'au purepure
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français

caféier

Noms anglais

coffee

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, forêt
mésophile de moyenne
altitude, forêt hygrophile de
basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
		X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Coffea spp.

Ligneux droit et élancé pouvant dépasser 5 m de hauteur, et possédant de nombreux rameaux horizontaux régulièrement caduques. Autrefois cultivé sous ombrage dans les îles hautes polynésiennes pour ses cerises aux effets stimulants ; employé dans la pharmacopée.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kafe	kafe	taofe, taohe
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tofi	taofe, taohe	taofe, taohe
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kape	taofe	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Coleus amboinicus

Lamiacées

Synonymes

Plectranthus amboinicus

Taxons concernés



Noms français

gros thym

Noms anglais

Cuban oregano, Indian mint

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Coleus amboinicus

Herbe mesurant moins de 1 m de haut, aux branches retombantes ; feuilles opposées succulentes très odorantes, dentées, longues de 4 à 10 cm sur 3 à 9 cm de large ; inflorescences terminales longues de 10 à 20 cm et comprenant quelques dizaines de fleurs ; fleurs bilabiées bleutées à roses, de 8 à 12 mm de long. Introduite pour ses feuilles odorantes.

Butaud, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Rare	Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très rare	Très rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Coleus
scutellarioides

Lamiacées

Synonymes

Coleus blumei, *Solenostemon*
scutellarioides, *Plectranthus*
scutellarioides

Taxons concernés



Noms français

vieux-garçon, coleus

Noms anglais

coleus

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Coleus scutellarioides

Plante peu ligneuse à tiges relativement charnues, atteignant plus de 1 m de hauteur et dotée de feuilles odorantes de coloris variés. Plante ornementale appréciée pour ses feuilles très colorées et légèrement odorantes ; employée également dans la pharmacopée locale.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE


Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
terevete	terevete, tevo	terevete, tegevete
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
terevete	terevete	terevete
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
terevete	terevete	terevete
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
terevete	terevete	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Noms français
colubrina d'Asie

Noms anglais
colubrina

- Type biologique
 - Liane grimpante
- Statut biogéographique
 - Indigène
- Degré de naturalisation

- Statut réglementaire
- Statut UICN

- Ecologie
 - Forêt sèche

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Nectar	Pollen	Miellat
--------	--------	---------

Colubrina asiatica var. *asiatica*

Plante sarmenteuse à tige de 5 cm de diamètre, atteignant plus de 15 m de hauteur en s'appuyant sur la végétation concurrente pour progresser vers la lumière ; feuilles alternes, simples, ovales, de 4 à 11 cm de long sur 2 à 5 cm de large, à marge dentée ; fleurs par groupes de 6 à 10, dotées de 5 pétales triangulaires verdâtres de 1,3 mm de long et de 5 étamines ; capsule globuleuse de 7 à 8 mm de diamètre, brune à maturité, contenant 3 graines. Très connue comme plante à savon dans tout le Pacifique et employée en médecine et cosmétique traditionnelles en Polynésie française.

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
tutu	tutu	tutu
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tutu	tutu
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tutu	tutu	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Commelina diffusa

Commélinacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

misère

Noms anglais

commelina, water grass

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Commelina diffusa

Herbe charnue aux tiges érigées de 50 cm puis retombantes et s'enracinant par marcottage ; feuilles lancéolées et pétales bleus. Considérée comme un bon fourrage pour les herbivores et les cochons domestiques ; anciennement utilisée dans les couronnes aux Marquises.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
heiotona, puvivi	pua 'ere'ere, mutie vai, teita vai	ma'a pape, nanamu, pininamu, puaninamu
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
ma'a pape, ma'a pua'atoro	ma'a pape	ma'a pape
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
veuvevui	ma'a pape, 'aihere pape	ma'a pape
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

*Coprosma
taitensis*

Rubiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Coprosma polynésien

Noms anglais

Polynesian Coprosma

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Endémique de la Société

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC

Ecologie

Forêt mésophile de
moyenne altitude, forêt
hygrophile d'altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X			

Coprosma taitensis

Atteignant 8 m de hauteur et 15 cm de diamètre, aux feuilles opposées, simples, ovales à obovales, de 4 à 7 cm de long sur 1 à 4 cm de large, à marge entière ; fleurs mâles et fleurs femelles sur des pieds différents, en groupes de quelques dizaines, dotées pour les fleurs mâles de 4 pétales verdâtres et 4 longues étamines, et pour les fleurs femelles de 4 pétales jaunâtres et 2 longs stigmates ; drupe globuleuse de 6 à 7 mm de diamètre, orange à maturité, contenant 1 à 2 graines. Aucun usage relevé.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Cordia lutea

Boraginacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

cordia jaune

Noms anglais

yellow cordia

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cordia lutea

Buisson atteignant au plus 5 m de hauteur et 20 cm de diamètre, doté de feuilles alternes, simples, ovales à elliptiques, de 4 à 9 cm de long sur 3 à 7 cm de large, de texture rapieuse et à marge crénelée ; fleurs par groupes de 5 à 40, portant une corolle jaune campanulée de 3 à 4 cm de diamètre, en forme de tube long de 3 cm et dotées de 5 à 7 lobes jaunes ; fruits sous la forme de drupes charnues translucides à maturité, de 1,5 à 2 cm de long sur 1 cm de large, contenant une unique graine. Fruit comestible parfois consommé et plus souvent utilisé pour la colle qu'il fournit ; fleurs rarement employées dans les couronnes.

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

makomako, kore,
pani hava,
pipinihau

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Cordia subcordata

Boraginacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

ébène du Pacifique, noyer du Pacifique

Noms anglais

sea trumpet, island walnut

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cordia subcordata

Atteignant 15 m de hauteur et plus de 1 m de diamètre, à l'écorce gris-beige, aux feuilles alternes, simples, ovales, de 10 à 30 cm de long sur 6 à 18 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupe d'une dizaine, portant une corolle orange de 4 à 6 cm diamètre, en forme de tube long de 2,5 cm et dotée de 4 à 8 lobes ; noix sèche ovale, brune à maturité, de 2 à 3,5 cm de long sur 1,8 à 2,5 cm de diamètre, comprenant de 1 à 4 amandes de 5 à 8 mm de long. Un des bois de sculpture et d'ébénisterie les plus recherchés ; plante médicinale bien connue et dotée d'amandes comestibles.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat
X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
tou	tou	tou
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tou	tou
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tou	tou, pua	tou
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
tou	tou, pua, kiripoa	



Nom scientifique

Cordyline fruticosa

Asparagacées

Synonymes

Cordyline terminalis

Taxons concernés

Noms français

cordyline

Noms anglais

cordyline, ti plant

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, forêt
mésophile de basse et
moyenne altitudes, forêt
hygrophile de basse et
moyenne altitudes

Cordyline fruticosa

Plante ligneuse peu ramifiée, aux feuilles rassemblées à l'extrémité des rameaux et possédant un tubercule souterrain comestible ; fleurs nombreuses, réunies en inflorescences, formant exceptionnellement des fruits pour les cultivars polynésiens. Nombreux cultivars dotés d'usages distincts et très variés, ornementaux, médicinaux, alimentaires, rituels, utilitaires...

Oudart (2015)

SOURCES

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X			

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ti, 'auti	ti, 'auti, 'outi	rauti, ti, 'auti, gauti
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
karokaro, ti	ti, 'auti	ti, 'auti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
ti, rauti	ti, 'auti	ti, 'auti
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
ti	ti	



Nom scientifique

Crotalaria spp.

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés

Crotalaria incana subsp. *incana*, *Crotalaria pallida* var. *obovata*

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X		



Crotalaria spp.

Atteignant 1,5 m de haut ; feuilles trifoliées aux folioles variables en forme et en taille selon les espèces ; inflorescences terminales comprenant plus d'une dizaine de fleurs à corolle papilionacée jaune ; gousses cylindriques longues de 2,5 à 4,5 cm sur 6 à 10 mm de large.

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

Noms français

crotalaire

Noms anglais

rattlepod

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières, landes sèches, zones cultivées

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pakoko, puatutu	pa'o'o tanitani, pa'o'o tani, kirikiri	pipipipi, tumu pipi
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pa'apa'a'ina	pa'apa'a'ina
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pipi		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Cucumis melo subsp. melo

Cucurbitacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

melon

Noms anglais

melon

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cucumis melo subsp. melo

Liane rampante atteignant plusieurs mètres ; feuilles ovales larges de 4 à 13 cm, anguleuses mais non lobées ; fleurs jaunes de 2,5 cm de diamètre divisées en 5 lobes ; fruit rond à ellipsoïdal jusqu'à 30 cm de diamètre, à pulpe orange, blanche, jaune ou verdâtre.

Nectar Pollen Miellat

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES


ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mereni, merone, hue kai te'e, katiu, hue katiu	'atiu, hue 'atiu	mereni papa'a
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	mereni papa'a, pohā	mereni papa'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
merone	mereni papa'a	mereni papa'a
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
mereni papa'a	mereni papa'a	





Noms français
concombre

Noms anglais
cucumber

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cucumis sativus

Liane grimpante atteignant plusieurs mètres ; feuilles triangulaires-ovales, anguleuses ou parfois trilobées, longues de 6 à 14 cm ; fleurs jaunes de 2,5 à 3 cm de large divisées en 5 lobes ; fruit globuleux à oblong ou cylindrique, vert à maturité, à pulpe blanche ou verdâtre.

Nectar	Pollen	Miellat
--------	--------	---------

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kokoma, katiu 'o'oa	kokoma	totoma
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	totoma, tutama	totoma, tutama
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	totoma	totoma
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Cucurbita spp.

Cucurbitacées

Synonymes

Taxons concernés

Cucurbita pepo, *Cucurbita maxima*

Noms français

courge, courgette, potiron, citrouille

Noms anglais

pumpkin, marrow

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cucurbita spp.

Liane atteignant plus de 5 m ; feuilles longues de 10 à 35 cm, généralement divisées en 3 à 5 lobes ; fleurs larges de 5 à 10 cm à corolle jaune divisée en 5 lobes ; fruits de formes très diverses, souvent de plus de 30 cm de diamètre.

Nectar Pollen Miellat

X X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
hue, hue rarahi, hue kai, hue 'akau	hue, hue mautini, hue kai	potini, po'otini, pautini, mautini
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
mautini, moutini	mautini, mauteni, pautini,	mautini, mauteni, pautini,
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tukuru	mautini	mautini
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
mautini	mautini	

Nom scientifique

*Cyclophyllum
barbatum*

Rubiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Cyclophyllum polynésien

Noms anglais

Polynesian Cyclophyllum

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cyclophyllum barbatum

Dépassant 6 m de haut et 20 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, ovales à elliptiques, de 7-11 cm de long sur 4-7 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de moins d'une demi-douzaine, odorantes, de 1 cm de long et portant 5 pétales blancs longs de 4 mm ; drupe charnue rose à rouge à maturité, ovoïde ou bilobée, de 8-12 mm de large et contenant le plus souvent 2 graines soudées. Fruit comestible et bois souvent utilisé pour confectionner les pieux destinés à débouliner les noix de coco.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Très rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très rare	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kohenua, koa	pu'uko, toauta, kofenua	mama, pa'oga
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
pakora, pa'oga	toro'e'a, torotea	toro'e'a, torotea, toro'ea
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
uareka, u'ureka	toro'e'a, hihiteka, hihite'a	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Cyperus aromaticus

Cypéracées

Synonymes

Kyllinga polyphylla

Taxons concernés

Noms français
carex de Navua

Noms anglais
Navua sedge

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières,
zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cyperus aromaticus

Atteignant 30 à 70 cm de haut ; feuilles basales, linéaires, de 15 cm de long sur 3 à 5 mm de large ; inflorescence sous la forme d'une tête d'épillets de 7 à 12 mm de diamètre et de couleur verte ; épillets de 4 mm de long sur 1 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

mou'u upo'o,
mo'u upo'o

mou'u upo'o,
mo'u upo'o

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français

carex de Java

Noms anglais

Java sedge

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale, lande sèche, fruticée de basse altitude

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat

Cyperus javanicus

Herbe formant des touffes denses, dotée de feuilles bleutées et coupantes, entourant plusieurs tiges florifères triangulaires les dépassant. Fibre tirée de la tige employée comme filtre en médecine traditionnelle ainsi qu'en lien pour pêcher ou attacher ensemble les poissons.

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mouku, mouku vai, mouku tai	mou'u, mou'u tai, mou'u vai	mo'u, mou'u, mou'u'u, mau'u'u, mau'u, mo'u ha'ari, mou'u tona
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
mokuku, mau'u'u, mou'u	mou'u ha'ari, mo'u ha'ari	mou'u ha'ari, mo'u ha'ari
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
to'ira	mo'u ha'ari, mau'u, mauku	mo'u, mou'u
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'u'uti	'u'uti	



Nom scientifique


Cyperus rotundus

Cypéracées

Synonymes



Taxons concernés



Noms français

herbe à oignons

Noms anglais

nutgrass

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Cyperus rotundus

Atteignant moins de 40 cm de haut et dotée d'un rhizome stolonifère et d'un bulbe globuleux ; feuilles basales de 2 à 5 mm de large ; chaume de 10 à 40 cm de haut portant des corymbes simples ou composés, lâche, avec de 2 à 10 rayons de 1 à 8 cm de long ; épis dotés de 3 à 10 épillets ; épillets rouges-bruns comprenant de 8 à 28 fleurs.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		'oniani, 'aihere 'oniani, tita 'oniani
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	matie 'oniani, 'aihere 'oniani	matie 'oniani, 'aihere 'oniani
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
'oniani		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Decalobanthus peltatus

Convolvulacées

Synonymes

Merremia peltata

Taxons concernés



Noms français

merremia

Noms anglais

peltate morning-glory

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Decalobanthus peltatus

Liane pérenne longue de 10 à 20 m ou plus ; feuilles alternes, simples, en forme de cœur, de 8 à 25 cm de diamètre ; fleurs blanches ; capsule de 1 à 3 cm de diamètre contenant 4 graines.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

pohue

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

pohue pohue

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Delonix regia

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

flamboyant de Madagascar

Noms anglais

royal poincinia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Delonix regia

Arbre au port tabulaire atteignant 15 m de haut et 50 cm de diamètre, à l'écorce lisse grise ; feuilles alternes, bipennées et composées de 11 à 20 paires de pennes, elles-mêmes divisées en 10 à 25 paires de folioles ; fleurs dotées de 5 sépales jaunes et rouges, et de 5 pétales rouges, jaunes ou orange ; gousse ligneuse, aplatie, de 20 à 70 cm de long sur 3 à 7 cm de large. Introduit pour ses qualités ornementales indubitables.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun



NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		ra'au marumaru

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pua'ura	pua'ura

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
	faifai

Nom scientifique

Dimocarpus longan

Sapindacées

Synonymes

Dimocarpus longan var. *longan*, *Euphoria longan*

Taxons concernés



Noms français

longanier, longan, œil de dragon

Noms anglais

longan

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X		

Dimocarpus longan

Atteignant 5 m de haut et 20 cm de diamètre ; feuilles composées de 2 à 4 paires de folioles de 3 à 20 cm de long sur 2 à 10 cm de large ; inflorescence de 8 à 40 cm de long comprenant plusieurs dizaines de fleurs jaunes ; fruit globuleux jaune-brun à maturité, de 2,5 cm de diamètre, lisse, comprenant une unique graine entourée d'un arille blanche. Introduit pour ses fruits comestibles.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Très rare Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare Rare Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très rare Très rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord


Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

matateni matateni

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Dodonaea viscosa

Ligneux très branchu atteignant jusqu'à 8 m de haut et 30 cm de diamètre, au port tortueux et à l'écorce se desquamant en fines lanières brunes ; feuilles alternes, simples, lancéolées à elliptiques, de 8 cm de long sur 2 cm de large, à marge entière, visqueuses ; fleurs en groupes de plus d'une centaine, comprenant des fleurs mâles, femelles et hermaphrodites, dotées de 4 sépales jaunes de 2 mm de long et d'une dizaine d'étamines uniquement pour les fleurs mâles ; capsule rouge à brune à maturité, de 1 cm de long sur 2 cm de large, composée de 2 à 4 ailles et comprenant plusieurs graines ovales noires. Bois résistant et flexible apprécié pour la fabrication d'hameçons, notamment ceux employés pour la pêche au poisson-purge ou 'uravena.

Rodgers (2017)

SOURCES

Noms français

Dodonaea

Noms anglais

hopbush

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile d'altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
			X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Très rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ti'ati'a	ka'iki, ka'i'i	'apiri
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
'apiri, mairari	'apiri	'apiri
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	'apiri	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français

duranta, vanillier de Cayenne

Noms anglais

golden dewdrop, pigeon berry

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Duranta erecta

Atteignant 5 m de haut et 20 cm de diamètre, aux rameaux parfois épineux ; feuilles ovale, longues de 1,5 à 5 cm pour 0,5 à 4 cm de large ; inflorescences longues de 15 cm et comprenant plusieurs dizaines de fleurs ; fleurs lilas dotées d'un tube et de 5 lobes, larges de 12 mm ; fruit jaune à maturité, de 6 à 12 mm de diamètre, comprenant 8 graines noyées dans une pulpe. Introduit pour ses fleurs et ses fruits à intérêt ornementaux.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Dypsis lutescens

Arécacées

Synonymes

Chysalidocarpus lutescens

Taxons concernés

Noms français

palmier multipliant

Noms anglais

golden cane palm,
butterfly palm

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Dypsis lutescens

Palmier en touffe dépassant rarement 5 m de hauteur, au stipe vert clair jaunissant avec l'âge et aux palmes agencées en spirale. Petit palmier ornemental très commun dans tous les archipels polynésiens, en pleine terre ou en pot, en extérieur ou en intérieur.

Nectar Pollen Miellat

X X

Butaud, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Rare Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Très rare Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare Très rare Très rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très rare Très rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

*Dypsis
madagascari-
ensis*

Arécacées

Synonymes

*Chrysalidocarpus
madagascariensis* var.
lucubensis

Taxons concernés



Noms français

palmier frisé

Noms anglais

Lucuba palm

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, forêt
mésophile de basse altitude,
forêt hygrophile de basse
altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Dypsis madagascariensis

Palmier généralement solitaire atteignant 10 m de hauteur, au stipe gris et aux palmes lâches arrangées en spirale à 3 côtés. Palmier ornemental commun dans tous les archipels polynésiens où il s'agit d'un des palmiers introduits les plus abondants.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Très rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
----------------	---------------	----------------

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
------	--------------	-------------------

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Elaeocarpus floridanus

Eléocarpacees

Synonymes

Elaeocarpus rarotongensis

Taxons concernés



Noms français

Elaeocarpus polynésien

Noms anglais

Polynesian Elaeocarpus

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat

Elaeocarpus floridanus

Atteignant jusqu'à 17 m et plus de 50 cm de diamètre, caractérisé par ses grands contreforts ; feuilles alternes, simples, ovales, de 15 cm de long sur 7 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupe d'une quinzaine, portant 4 à 5 pétales blancs découpés au sommet, de 5,5 à 6 mm de long ; drupe charnue, bleu à maturité, de 1,4 cm de long sur 1,2 cm de large, ne comportante qu'une unique graine.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre	Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		tutae 'iore, hoto
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre	Tuamotu Est



Nom scientifique

Elephantopus mollis

Astéracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

faux-tabac

Noms anglais

tobacco weed, soft elephant's-foot, elephant's-foot

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, lande sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Elephantopus mollis

Atteignant 80 cm de haut, aux tiges pileuses ; feuilles principalement basales aux limbes de 7 à 22 cm de long sur 2 à 7 cm de large, oblancéolées ; groupes de plusieurs têtes portés par de longs pédoncules ; têtes composées de 4 fleurs ; corolles rosâtres ou blanches de 3 à 4 mm de long ; akènes de 2 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
fotapa	fotapa	'aihere 'ava'ava, 'aihege 'ava'ava, tita 'ava'ava
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'aihere 'ava'ava	'aihere 'ava'ava
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
'ava'ava rapakau	'aihere 'ava'ava	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Emilia spp.

Astéracées

Synonymes

Emilia fosbergii

Taxons concernés

Emilia fosbergii, *Emilia sonchifolia*



Noms français

laiteron, émilia, herbe à lapins

Noms anglais

Flora's paintbrush, emilia

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Emilia spp.

Herbes atteignant 80 cm de haut, aux tiges et feuilles produisant un lait lorsque cassées ; feuilles longues de 3 à 13 cm sur 1,5 à 6 cm de large ; 3 à 5 têtes portées par pédoncule long de 15 à 30 cm ; têtes de 10 à 15 mm de long sur 6 à 10 mm de large, composées de 20 à 50 fleurs ; corolles roses à rouges selon les espèces.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
eita rapiti, mahimahi	kaikai rapeti, kaikai rape, teita kio'e farani, tueiao	ma'a rapiti
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	ma'a rapiti	ma'a rapiti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kairapiti	ma'a rapiti	ma'a rapiti
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
ma'a rapiti	ma'a rapiti	



Nom scientifique

Erythrina
variegata

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

érythrine, arbre à baleines,
arbre corail

Noms anglais

coral tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt sèche, forêt mésophile
de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X		

Erythrina variegata

Dépassant 20 m de hauteur et 2 m de diamètre, défeuillé lors des sécheresses, à l'écorce dotée de grosses épines, aux feuilles trifoliées, aux fleurs rouges et aux gousses à graines brun à rouge. Plante marquant les saisons et notamment l'arrivée des baleines lorsqu'elle est défeuillée ; son écorce et ses feuilles sont employées en médecine traditionnelle.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Peu commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Rare	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kenae, ketae	anetae, aretae	'atae, natae, 'anatae
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
gatae	'atae	'atae
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
gatae		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Eugenia uniflora

Myrtacées

Synonymes

Eugenia michelii

Taxons concernés



Noms français

Cerisier de Cayenne,
cerise carrée, pitanga

Noms anglais

Surinam cherry

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Fourré mésophile, zones
habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Eugenia uniflora

Atteignant 2 à 5 m de haut à l'écorce rosâtre se desquamant en plaques ; feuilles simples, opposées, de 4 à 7 cm de long sur 2 à 4 cm de large, ovales, coriaces ; fleurs solitaires blanches ; fruits charnus globuleux de 1 à 2 cm de diamètre avec 8 côtes saillantes. Introduit pour son fruit comestible relativement acidulé.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord Peu commun Marquises Sud Commun Australes Nord Peu commun

Rapa Très rare Iles du Vent Peu commun Iles sous le Vent Peu commun

Gambier Peu commun Atolls soulevés Rare Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord cerise, cerice Marquises Sud fei'a papa'a, monamona, ceri, teri papa'a, tegi Australes Nord

Rapa pitana Iles du Vent pitana Iles sous le Vent

Gambier cerise, vine Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

*Euphorbia
fosbergii*

Euphorbiacées

Synonymes

Chamaesyce fosbergii

Taxons concernés



Noms français

euphorbe des plages

Noms anglais

Polynesian beach-spurge

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Endémique de Polynésie

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC

Ecologie

Forêt littorale, fruticée de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Euphorbia fosbergii

Arbrisseau atteignant plus de 2 m de haut et 1,5 cm de diamètre, au latex blanc abondant ; feuilles opposées, simples, obovales, de 9 à 42 mm de long sur 7 à 28 mm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de plusieurs dizaines sous forme d'unités comprenant 1 unique fleur femelle, de 48 à 72 fleurs mâles et 4 glandes en forme de pétale vert à la base et blanc à l'extrémité de 1,5 à 2,5 mm de long ; capsule trilobée de 2 mm de long sur 3 mm de diamètre, contenant 3 graines. Il s'agit d'une plante médicinale également employée pour son latex collant.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013), Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Commun Très commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

pipitai, rau'u'a, pipimato

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

'atoto pipiriri, 'aihere tapau

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

'atoto, pipiriri, pipiriri tapau, tahetahe pipiriri, pipiriri tapau

Tuamotu Centre Tuamotu Est

tahetahe, pipiriri



Nom scientifique

Euphorbia milii
var. *splendens*

Euphorbiacées

Synonymes

Taxons concernés



Euphorbia milii var.
splendens

Atteignant 1 m de haut, à rameaux dressés et charnus portant de nombreuses épines ; feuilles alternes obovales de 6 cm de long sur 2 cm de large ; inflorescences comprenant plusieurs fleurs rouges, roses ou jaunes. Plante ornementale.

Noms français
épines du Christ

Noms anglais
Christ-thorn

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Peu commun Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun Peu commun Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Rare Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

tiare taratara,
hei taratara tiare taratara,
hei taratara

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Fagraea berteroana

Noms français
bois pétrole, pua

Noms anglais
pua, pua kenikeneni

Type biologique
Arbre

Statut biogéographique
Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de moyenne et haute altitudes, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X		X

Port trapu à tendance arbustive, généralement branchu dès la base, aux branches sinueuses et à l'écorce épaisse, rugueuse et fissurée, atteignant 15 m de haut et 1 m de diamètre ; feuilles opposées, simples, elliptiques à obovales, de 8 à 22 cm de long sur 6 à 10 cm de large, charnues, à marge entière ; fleurs par groupes de 3 à 25, avec une corolle blanche à jaune très odorante, en forme de trompette, composée d'un tube long de 4 à 11 cm et 5 pétales longs de 2 à 3,5 cm ; baie ellipsoïdale orange à maturité, de 3,5 à 5 cm de long sur 2 à 3 cm de large et contenant plusieurs dizaines de graines noires noyées dans une pulpe orange. Fleur très appréciée pour son odeur et employée pour la confection de couronnes et de monoï ; bois de sculpture très durable utilisé autrefois.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pua 'enana, ka'upe, pua	ka'upe, pua, pua ho'ovai	pua
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
pua	pua, hauou	pua, pua no'ano'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Falcataria moluccana

Fabacées

Synonymes

Albizia falcata, *Paraserianthes falcataria*

Taxons concernés



Noms français

falcata

Noms anglais

Molucca albizia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de moyenne altitude, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Falcataria moluccana

Atteignant plus de 40 m de haut et 1,5 m de diamètre, à l'écorce lisse et grise ; port tabulaire caractéristique ; feuilles composées comportant de 8 à 15 paires de pennes, chacune se divisant en 15 à 25 folioles elliptiques ; fleurs réunies par dizaines dans des panicules, à la corolle crème à jaune verdâtre et aux nombreuses étamines blanches longues de 1 à 1,7 cm ; gousse plate de 10 à 15 cm de long sur 1,5 à 2,5 cm de large. Introduit pour sa capacité à fixer efficacement l'azote dans le sol et à ainsi les enrichir.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Très commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Très commun	Très commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
falcata	falcata	ra'au marumaru, ga'au magumagu, falcata
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	farakata, ra'au marumaru	farakata, ra'au marumaru
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
falcata, marumaru		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Flacourtia spp.

Salicacées

Synonymes

Taxons concernés

Flacourtia rukam, *Falcourtia indica*

Noms français

prune, prunier malgache, rukam, lovi-lovi

Noms anglais

plum, prune

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
	X	X	
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Flacourtia spp.

Atteignant 10 m de haut et 30 cm de diamètre ; feuilles dentées, simples, ovales à elliptiques, de 2 à 15 cm de long sur 2 à 6 cm de large ; inflorescences comprenant moins d'une dizaines de fleurs ; fleurs apétales comprenant 4 à 6 sépales jaunâtres et de nombreuses étamines ; fruits globuleux ou ovoïdes selon les espèces, de plusieurs cm de diamètre, rouges à noirs à maturité. Plusieurs espèces introduites pour leurs fruits comestibles.

Nectar Pollen Miellat

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Gardenia taitensis

Rubiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

tiare tahiti, gardénia tahitien

Noms anglais

Tahitian gardenia

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Gardenia taitensis

Arbuste dioïque pouvant atteindre 4 à 5 m de hauteur, comporter de nombreuses ramifications et produire plusieurs dizaines de fleurs blanches à 5-8 pétales chaque jour ; les pieds mâles étant les plus florifères, ils sont préférés aux pieds femelles formant de grands fruits à la pulpe orange et aux nombreuses graines. Plante ornementale, cosmétique et médicinale de première importance, cultivée et utilisée dans la totalité des îles habitées.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Très commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
tia'e	tia'e	tiare tahiti, tiare ta'iti, tiare ma'ohi, tiage tahiti
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tiare	tiare tahiti	tiare maurua, tiare tahiti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tiare	tiare tahiti	tiare tahiti
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
tiare tahiti	tiare tahiti	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE LAOONNAIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Gossypium barbadense

Malvacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

cotonnier

Noms anglais

cotton

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Gossypium barbadense

Arbuste atteignant jusqu'à 3 m de haut et 15 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, divisées en 3 à 5 lobes, de 5 cm de long sur 5 cm de large, à marge entière ; fleurs solitaires, portant 5 pétales jaunes ; capsule ovoïde de plus de 2 cm de long, comprenant plusieurs graines noyées dans du coton blanchâtre

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Rare	Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pupuru hao'e, 'uru, haha'avai hao'e	'uru'uru	vavai
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	vavai papa'a	vavai papa'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
koumiro 'iva, komiro 'iva		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Graptophyllum pictum

Acanthacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

graptophylle peint

Noms anglais

caricature plant

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Graptophyllum pictum

Atteignant 3 m de haut et 10 cm de diamètre ; feuilles de 6 à 20 cm de long sur 3 à 13 cm de large, elliptiques à oblongues ou lancéolées, à marge ondulé, de couleur verte panachée de blanc ou pourpre ; inflorescences terminales composées d'une dizaine de fleurs dotées d'une corolle pourpre de 3 à 4 cm de long ; aucun fruit formé en Polynésie. Ornementale.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Peu commun Marquises Sud Peu commun Australes Nord Peu commun

Rapa Peu commun Iles du Vent Peu commun Iles sous le Vent Peu commun

Gambier Peu commun Atolls soulevés Peu commun Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Grevillea robusta

Protéacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

chêne d'Australie,
grévilléa

Noms anglais

silver oak, silky oak

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Plantations forestières, forêt
hygrophile de basse et
moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Grevillea robusta

Atteignant 25 m de haut et 70 cm de diamètre, à écorce crevassée de couleur brun rouge ; feuilles alternes, bipennatifides, divisées en 10 à 21 segments et longues de 15 à 30 cm ; inflorescences rassemblant plusieurs dizaines de fleurs comportant un calice tubuleux long de 6 à 9 mm et de couleur orange à rouge ; fruit sous la forme d'un follicule brun à maturité long de 1,5 à 2 cm et libérant 1 à 2 graines ailées. Introduit pour son bois de qualité ainsi que ses propriétés ornementales.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Rare Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

Kahaia

Noms anglais

Guettarda

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche, forêt mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat

Guettarda speciosa

Atteignant 15 m de haut et plus de 50 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, obovales, de 35 cm de long sur 20 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes d'une dizaine, sous la forme d'un tube de 5 cm surmonté par 5 à 9 pétales blancs odorants ; drupe charnue blanche à rose à maturité, ovoïde, de 1,5 à 3 cm de diamètre, comprenant une unique graine. Prisé pour son bois employé pour la fabrication de pirogues et de nombreux ustensiles, et pour ses fleurs afin de parfumer le monoï.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Rare	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Très commun	Très commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très commun	Très commun	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
hano	hano, fano	tafano
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tafano	tafano
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
ta'ano, 'ano	tafano, kahaia	tafano, kahaia
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
kahaia	kahaia, karauri	

Nom scientifique

Gymnosporia crenata

Celastracées

Synonymes

Celastrus crenatus, *Maytenus crenatus*

Taxons concernés

Noms français

Maytenus marquisien

Noms anglais

Marquesan Maytenus

Type biologique

Sarmenteux

Statut biogéographique

Endémique des Marquises

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC

Ecologie

Lande sèche, fourré sec, forêt sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Gymnosporia crenata

Plante sarmenteuse longue de 2 à 5 m pour 10 à 20 cm de diamètre, sans épine ; feuilles ovales à elliptiques, simples, dentées, subcoriaces, longues de 7 à 10 cm sur 3 à 5 cm de large ; inflorescences comprenant quelques dizaines de fleurs ; fleurs dotées de 5 courts sépales rouges, de 5 pétales blancs et de 5 étamines ; capsules de 8 à 10 mm de diamètre, rouges à maturité et s'ouvrant en 3 loges ; graines dotées d'une arille à une extrémité.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

koinaina, inaina, koina

inaina, ineine

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Nom scientifique

Haematoxylon campechianum

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

bois de Campêche

Noms anglais

campeachy tree,
blackwood, logwood,
bluewood

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt sèche de basse
altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
			X

Haematoxylon campechianum

Atteignant 8 m de haut et 20 cm de diamètre, au tronc cannelé, à l'écorce lisse et aux rameaux épineux ; feuilles paripennées comprenant 1 à 4 paires de folioles obovales longues de 1 à 3 cm sur 1 à 2,5 cm de large ; inflorescences en racèmes comptant plusieurs dizaines de fleurs ; fleurs très odorantes dotées de 5 sépales, de 5 pétales jaunes de 4 à 6 mm de long et de 10 étamines ; gousse plate de 2 à 6 cm de long, brune à maturité.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar

Pollen

Miellat

X

X

ABONDANCE

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Noms français

faux-tabac, veloutier,
arbre à gratte

Noms anglais

tree heliotrope

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Heliotropium arboreum

Atteignant jusqu'à 10 m de hauteur et 50 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, obovales, charnues, veloutées, de 7 à 25 cm de long sur 3 à 10 cm de large, à marge entière ; fleurs regroupées par centaines, de 4 à 7 mm de diamètre, et comportant 5 pétales blancs ; drupe charnue, globuleuse, jaunâtre à maturité, de 4 à 6 mm de diamètre et se séparant en 2 à 4 parties comprenant chacune 2 graines. Plante médicinale employée pour traiter différentes affections comme les aphtes mais surtout réputée dans les cas de ciguatera.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.,
Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Rare Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun Très commun Très commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très commun Très commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

tahinu, ta'inu,
tohonu, tohinu,
'io'ugu

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

tai'anu tahinu, tohonu,
tohinu tahinu, tohonu,
tohinu

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

to'unu tahinu, tohonu,
geogeo tohonu

Tuamotu Centre Tuamotu Est

geogeo, tohonu piupiu, tohonu,
geogeo, matika



Nom scientifique

*Heterotis
rotundifolia*

Mélastomatacées

Synonymes

Dissotis rotundifolia

Taxons concernés

Noms français

Dissotis

Noms anglais

rock rose, pink lady

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Heterotis rotundifolia

Herbe rampante à grimpante s'enracinant aux nœuds, longue de plusieurs mètres ; feuilles opposées, simples ; fleurs solitaires campanulées aux pétales roses à pourpres ; fruits apparemment non formés en Polynésie. Apparemment introduite pour couvrir les talus des routes ou des terrassements.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS


Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

ketmie à feuilles de tilleul,
hibiscus des plages, burao

Noms anglais

beach hibiscus

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt
mésophile de basse et
moyenne altitudes, forêt
hygrophile de moyenne
altitude

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	X

Hibiscus tiliaceus subsp. *tiliaceus*

Port dressé à couché, souvent caractérisé par des branches retombantes se marcottant naturellement, atteignant jusqu'à 15 m de haut et 100 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, en forme de coeur, de 14 cm de long sur 12 cm de large, pileuses, à marge entière ; fleurs par groupes d'une demi-douzaine, portant 5 pétales jaunes à tache basale pourpre et se fanant rouge, de 45 à 82 mm de long ; capsule de 2 cm de long sur 1,5 cm de large, libérant ses graines par 5 valves. Plante médicinale de première importance, également largement utilisée notamment pour ses feuilles, son bois et les fibres de son écorce.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très commun	Très commun	Très commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Très commun	Très commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très commun	Rare	Très rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
hau	fau	purau, 'au, hau, fau, pugau
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
purau, fau, more	purau, fau, hau	purau, fau, hau
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
'au	purau, fau	purau, fau
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
purau	purau	



Nom scientifique

*Hygrophila
erecta*

Acanthacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Hygrophila

Noms anglais

Hygrophila

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Hygrophila erecta

Atteignant 1,5 m de haut ; feuilles opposées, entières, obovales à oblancéolées ; inflorescences comprenant plusieurs dizaines de fleurs dotées d'un calice cylindrique long de 10 à 12 mm et d'une corolle bilabée bleue à pourpre ; capsules de 1,5 cm de long.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

Hyptis

Noms anglais

knobweed, hyptis

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Hyptis spp.

Atteignant 2 m de haut, aux tiges et feuilles diversement odorantes selon les espèces ; feuilles opposées longues de 2 à 15 cm sur 1 à 7 cm de large, lancéolées, ovales à elliptiques selon les espèces, crénelées ; inflorescences diversement composées et ramifiées, en branches scorpioïdes ou en têtes sphériques ; corolles longues de 3 à 4,5 mm, blanches ou bleues pâles ou lavées de rose ; graines de 1 à 2 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

X X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Très rare

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Nom scientifique

Indigofera suffruticosa

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

indigotier, indigo bâtard

Noms anglais

indigo

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Indigofera suffruticosa

Atteignant 2,5 m de haut ; feuilles imparipennées comprenant 9 à 17 folioles elliptiques de 1 à 3,5 cm de long sur 0,3 à 1,5 cm de large ; inflorescences longues de 2 à 4 cm regroupant plusieurs dizaines de fleurs à corolle papilionacée rose à rouge ; gousse cylindrique, largement courbée, de 1,5 à 2 cm de long.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kohuhu, kohuhu farani, kohuhu pueva, kohuhu uta	kohuhu hao'e, kohuhu farani	
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Inga feuilleei

Fabacées

Synonymes

Inga edulis

Taxons concernés

Noms français

pacayer

Noms anglais

inga, ice-cream bean

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Inga feuilleei

Atteignant jusqu'à 20 m de haut, doté de feuilles au rachis ailé, de fleurs aux nombreuses étamines blanches et de fruits comestibles. Cultivé pour ses longues gousses qui contiennent, autour des graines noires aplaties, une pulpe blanche comestible.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pakai	pakai	pakai, patai
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
patai	patai, pakai	patai, pakai
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pakai	pakai	pakai
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
pakai	pakai	



Nom scientifique

Inocarpus fagifer

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Inocarpus fagifer

Dépassant 30 m de haut, au tronc cannelé et aux contreforts caractéristiques ; petites fleurs aux pétales ondulés et à l'odeur caractéristiques ; fruit vert à orange à maturité, proche de 10 cm de long et contenant une unique amande. Son amande bouillie est encore largement consommée ; une teinture rouge était produite à partir de la sève des jeunes fruits ou de l'écorce.

Noms français

châtaignier d'Océanie

Noms anglais

Tahitian chestnut tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt hygrophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
			X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES


ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Très rare	Très rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ihi	ihi	mape
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
mape	mape, rata, ihi	mape, ihi
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
mape	mape	mape
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
mape	mape	





Noms français

liseron des haies

Noms anglais

obscure morning-glory

- Type biologique
- Liane grimpante
- Statut biogéographique
- Introduction moderne
- Degré de naturalisation
- Adventice
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
- Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X		

Ipomoea obscura

Liane grimpante longue de 3 m ou plus ; feuilles ovales à cordées, entières, de 3 à 9 cm de long sur 1,5 à 8 cm de large ; fleurs à 5 sépales longs de 4 à 8 mm et une corolle de 1,4 à 2,5 cm de long, à 5 lobes jaune pâle à blanc ; capsule ovoïde de 8 à 12 mm de long.

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare		

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Ipomoea pes-caprae subsp. *brasiliensis*

Convolvulacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

ipomée pied-de-chèvre

Noms anglais

beach morning-glory

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Ipomoea pes-caprae subsp. *brasiliensis*

Liane rampante dépassant 10 m de long pour 1 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, charnues, elliptiques, de 5 à 11 cm de long sur 4 à 8 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de 1 à 8, dotées d'une corolle rose en forme d'entonnoir, de 5 à 7 cm de long ; capsule globuleuse, brune à maturité, de 1,5 cm de diamètre et contenant 1 à 4 graines adaptées au transport par flottaison. Liane aux rares usages médicaux mais appréciée pour son port et ses fleurs ornementales ainsi que pour ses graines employées en artisanat.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Très rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pohue tai	pohue tai	pohue miti, pohue 'ute'ute, po'ue, po'ue 'ura'ura, ave, ave ave
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pohue tatahi, pohue miti, pohue tahatai	pohue tatahi, pohue miti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
po'ue	pohue tatahi	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Jatropha gossypifolia

Euphorbiacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français
médecinier sauvage

Noms anglais
cotton-leaved physic nut

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X		
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X		

Jatropha gossypifolia

Atteignant 1,5 m de haut, à odeur désagréable, aux tiges charnues emplies de sève jaune claire ; feuilles à 3-5 lobes obovales, très pileuses ; inflorescences comprenant des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées dotées de 5 pétales rouges ; fruit trilobé de 1 cm de diamètre.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun Très rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord


mohoi

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français
jatropha, médicinier

Noms anglais
pink-flowered jatropha

Type biologique	Arbuste
Statut biogéographique	Introduction moderne
Degré de naturalisation	Cultivée
Statut réglementaire	
Statut UICN	
Ecologie	Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Jatropha integerrima

Atteignant 3 m de haut, renfermant une sève acqueuse ; feuilles ovales entières ou portant parfois 1 ou 2 lobes latéraux discrets, jusqu'à 12 cm de long et 6 cm de large ; inflorescences terminales longues de 9 à 25 cm et comprenant plusieurs fleurs de 2 cm de long à corolle rouge sang à rose-rouge.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Lantana camara

Verbénacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

lantana, lantanier, corbeille d'or

Noms anglais

lantana

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, lande sèche, fruticée de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Lantana camara

Arbuste plus ou moins sarmenteux de 1 à 2 m de haut, aux rameaux couverts d'épines acérées ; feuilles odorantes, simples, opposées, de 2 à 12 cm de long sur 2 à 5 cm de large, rugueuses au toucher ; fleurs jaunes, roses, rouges, orange, regroupées en inflorescences terminales de 3 à 5 cm de diamètre ; fruits charnus de 6 mm de diamètre, violets à noirs à maturité. Autrefois cultivée comme plante ornementale.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		tataramoa, tarataramoa
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	ra'au taratara, ratana, tarataramoa	ra'au taratara, ratana, tarataramoa
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tarako'a		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français
lantana rampant,
lantancier rampant,
lantana inerme

Noms anglais
trailing lantana

- Type biologique
Arbuste
- Statut biogéographique
Introduction moderne
- Degré de naturalisation
Cultivée
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Lantana montevidensis

Plus ou moins lianescent aux branches retombantes atteignant 2,5 m de long ; feuilles de 1,5 à 3,5 cm de long sur 0,8 à 1,6 cm de large, ovales et dentées ; fleurs regroupées dans des têtes de 2,5 cm de diamètre, de couleur rose-lilas ; drupes violet foncé, sphériques, de 4 mm de diamètre.

Nectar	Pollen	Miellat
X		

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare		
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare		Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
		ra'au taratara, ratana, tarataramoa
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Leucaena leucocephala

Fabacées

Synonymes

Leucaena glauca

Taxons concernés



Noms français

acacia, faux-acacia, leucaena

Noms anglais

wild tamarind, leucaena, lead tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Fourré sec, forêt sèche de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Leucaena leucocephala

Atteignant 10 m de haut et 30 cm de diamètre ; feuilles alternes, bipennées, composées de 3 à 8 paires de pennes opposées, elles-mêmes divisées en 7 à 20 paires de folioles subopposées ; inflorescences globuleuses rassemblant plusieurs dizaines de fleurs longues de 5 mm ; gousse aplatie de 8 à 20 cm de long sur 1,5 à 2 cm de large, brune à maturité et comprenant de 15 à 25 graines. Introduit pour ses propriétés fourragères.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Rare	Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
atiko, acacia	atiko, acacia	acacia

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	acacia	acacia

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
acacia	acacia	acacia

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
acacia	acacia



Nom scientifique

Litchi chinensis

Sapindacées

Synonymes

Nephelium litchi

Taxons concernés



Noms français

litchi

Noms anglais

lychee

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X		

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Litchi chinensis

Atteignant 20 m de haut et 80 cm de diamètre, à écorce lisse ; feuilles alternes, paripennées, composées de 2 à 4 paires de folioles opposées ; inflorescences comprenant des dizaines de fleurs minuscules dépourvues de pétale ; drupe ovoïde de 2,5 à 4 cm de diamètre, à la peau rugueuse, rouge à maturité et contenant une unique graine. Cultivé pour ses fruits comestibles très recherchés ; son bois est également apprécié en ébénisterie.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Très rare	Très rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Très rare	Très rare

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	raitihī	raitihī

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Ludwigia spp.

Onagracées

Synonymes

Ludwigia peruviana

Taxons concernés

Ludwigia peruviana, *Ludwigia octovalvis*



Noms français

ivraie, primevère du Mexique

Noms anglais

willow primrose

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Ludwigia spp.

Atteignant 2 m de haut, plus ou moins glabre selon les espèces ; feuilles alternes, simples, lancéolées, longues de 4 à 14 cm sur 0,5 à 4 cm de large ; fleurs dotées de 4 pétales jaunes longs de 0,5 à 2 cm ; capsules longues de 1,5 à 4,5 cm parcourues par 4 à 8 lignes selon les espèces.

Nectar Pollen Miellat

X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Très rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kamore, akamore, more, pavai, timoi	more, pua taunapinao, timoi, kamore	torea, ra'au papa'a, ra'au tupuai, ga'au tupuai
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	titania	titania
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kovai, kovai repo taro	titania	titania
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Macropiper
latifolium

Pipéracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

faux kava

Noms anglais

false kava

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de moyenne altitude, forêt hygrophile de moyenne et haute altitudes, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Macropiper latifolium

Atteignant 5 m de haut et 6 cm de diamètre, à tige creuse ; feuilles alternes portées par un pétiole de 2 à 11 cm de long, au limbe ovale à cordé d'environ 20 cm de long ; inflorescences disposées en épis groupés par 2 à 4 d'environ 10 cm de long ; fruits rouges et charnus de 2 mm de diamètre.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kavakavaatua, pa'avatua	pa'avatua	'ava'avaira'i, 'ava'avavaira'i, 'ava'avaiga'i
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'ava'avaira'i	'ava'avaira'i
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Nom scientifique

Macroptilium lathyroides

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

pois poison

Noms anglais

phasey bean

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Macroptilium lathyroides

Atteignant 1 m de haut au port retombant ; feuilles trifoliées aux folioles elliptiques de 3 à 8 cm de long sur 0,5 à 2 cm de large ; fleurs souvent par paires, longues de 1,5 à 2,5 cm, à corolle papilionacée de couleur maron, pourpre à rouge ; gousses cylindriques longues de 6 à 10 cm sur 3 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

X X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Rare	Rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Rare	Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		ra'au to'eto'e

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
		piripiri 'aratita

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Malpighia emarginata

Malpighiacées

Synonymes

Malpighia puniceifolia

Taxons concernés



Noms français

acérola, cerise de la Barbade, cerisier des Antilles

Noms anglais

acerola, Barbados cherry

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat

Malpighia emarginata

Atteignant 3 m de haut ; feuilles opposées, simples, longues de 3 à 7 cm sur 1 à 2 cm de large ; fleurs en petits groupes de 3 à 5, de 12 mm de diamètre, dotées de 5 pétales frangés ; fruits sous la forme de drupes rouges comestibles de 8 à 25 mm de long.

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare		

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Très rare		

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
------	--------------	-------------------

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------





Noms français
manguier

Noms anglais
mango tree

- Type biologique
Arbre
- Statut biogéographique
Introduction moderne
- Degré de naturalisation
Naturalisée
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Mangifera indica

Grand arbre au houppier dense et sombre et à l'écorce brune crevassée pouvant atteindre près de 30 m de hauteur et 1 m de diamètre ; feuilles simples, lancéolées, subcoriaces ; nombreuses fleurs réunies en inflorescences terminales ; fruits sous la forme de drupes de couleur orange à maturité. Apprécié pour ses fruits consommés verts, mûrs ou sous forme de jus et pour son tronc de grande taille employé en sculpture ou menuiserie.

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse altitude

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mako	mako	vi, vi popa'a

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
vi rapa	vi papa'a	vi papa'a

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
makirie, tumu vi	vi popa'a	vi popa'a

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
vi popa'a	vi popa'a



Nom scientifique

*Melaleuca
citrina*

Myrtacées

Synonymes

Callistemon citrinus

Taxons concernés



Noms français

rince-bouteille, calistemon

Noms anglais

crimson bottlebrush

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	

Melaleuca citrina

Atteignant 4 m de haut, aux rameaux retombants ; feuilles subsessiles longues de 3 à 9 cm sur 0,6 à 1,3 cm de large ; inflorescence se développant sous la forme d'une section florifère de la tige de 5 à 10 cm, entre deux sections feuillées ; fleurs à étamines rouges de 1,5 à 3 cm de long ; capsules ovoïdes. Introduite comme plante ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

*Melicoccus
bijugatus*

Sapindacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français
quenettier

Noms anglais
Spanish lime

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Melicoccus bijugatus

Atteignant 20 m de haut et 60 cm de diamètre, à écorce lisse et grise ; feuilles alternes, paripennées, au rachis ailé et composées de 2 ou 3 paires de folioles subopposées ; inflorescences comptant plusieurs dizaines de fleurs verdâtres à blanchâtres ; drupes globuleuses charnues, de 2,5 à 3 cm de diamètre, verte à maturité, à la pulpe jaune englobant l'unique graine. Planté pour ses fruits comestibles très appréciés des enfants.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Rare

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
----------------	---------------	----------------

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tene	tene	tene

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



CHAMBRE DE L'AQUACULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Noms français

rose de bois, rose-bois

Noms anglais

wood-rose

- Type biologique
- Liane grimpante
- Statut biogéographique
- Introduction moderne
- Degré de naturalisation
- Adventice
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
- Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
			X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X		

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Merremia tuberosa

Liane grimpante atteignant plus de 10 m de long ; feuilles simples, circulaires de 6 à 16 cm de diamètre, divisées profondément en 5 à 7 lobes ; inflorescences comprenant une dizaine de fleurs ; fleurs dotées d'un calice jaunâtre et d'une corolle jaune ; capsules globuleuses de 3 à 3,5 cm de diamètre, comprenant de 1 à 4 graines. Ornementale.

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare		

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
------	--------------	-------------------

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

*Merremia
umbellata
subsp. orientalis*

Convolvulacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

liseron jaune

Noms anglais

yellow wood-rose

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Merremia umbellata subsp. orientalis

Liane grimpante ou rampante atteignant plus de 5 m de long ; feuilles entières, ovales à cordées, de 4 à 15 cm de long sur 3 à 7 cm de large ; inflorescences comprenant une dizaine de fleurs dotées de sépales longs de 5 à 10 mm et d'une corolle jaune en forme de coupe de 2 à 3,5 cm de long ; fruit ovoïde à conique de 10 à 12 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Très rare Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Metrosideros collina

Myrtacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Metrosideros polynésien

Noms anglais

Polynesian metrosideros

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Endémique de Polynésie

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de moyenne altitude, forêt hygrophile de haute altitudes, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Metrosideros collina

Atteignant jusqu'à 20 m de haut et 1 m de diamètre, souvent plus petit ; feuilles opposées, simples, elliptiques, coriaces, de 2-10 cm de long sur 1-0 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de quelques dizaines, composées de 5 pétales rouges longs de 3-6 mm et d'une quinzaine de longues étamines oranges à rouges ; capsules brunes à 3 valves larges de 5-10 mm, libérant des dizaines de petites graines filiformes longues de 1 à 2 mm. Fleurs anciennement employées en ornementation dans les cheveux.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
he'ua	fe'ua	puarata, tutupu, gata, puagata
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
kopapa, tuputupu, rata	puarata	puarata
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Mimosa
diplotricha var.
diplotricha

Fabacées

Synonymes

Mimosa invisa

Taxons concernés

Noms français
sensitive géante

Noms anglais
giant sensitive weed

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières,
zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Mimosa diplotricha var.
diplotricha

Liane pouvant atteindre 4 m de long, dotées de nombreuses épines de 3 à 6 mm de long sur la tige et les feuilles ; feuilles alternes composées de 3 à 8 paires de pennes divisées en 12 à 30 paires de folioles ; fleurs roses longues de 3 à 6 mm réunies par dizaines en inflorescences globuleuses ; gousse aplatie de 1 à 3 cm de long, épineuse et collante.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Commun

Commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Peu commun

Rare

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Mimosa pudica
var. *unijuga*

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

sensitive, petite sensitive

Noms anglais

sensitive weed

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Mimosa pudica var. *unijuga*

Herbe rampante atteignant 1,2 m de long, portant des épines le long de la tige ; feuilles bipennées comprenant 1 à 2 paires de pennes se refermant lorsque touchées, elles-mêmes se divisant en 10 à 26 paires de folioles ; fleurs regroupées dans des têtes de 1 cm de diamètre, à corolle rouge et étamines roses ; gousses épineuses de 1 à 2 cm de long sur 3 à 5 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

X X

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
'eita haka'ika, 'eita haka'ina, pua haka'ika	teita haka'ina, teita ta'ata'a	pohe ha'avare, pope 'a'avare, pope ha'avage
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pohe ha'avare	pohe ha'avare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	pohe ha'avare	pohe ha'avare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Momordica charantia

Cucurbitacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

momordique, fuka, margose

Noms anglais

balsam pear

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse altitude, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Momordica charantia

Liane grimpante longue de plusieurs mètres ; feuilles simples de 4 à 10 cm de long, profondément divisées en 3 à 5 lobes ; vrilles présentes ; fleurs solitaires dotées de 5 pétales jaunes de 10 à 12 mm de long ; fruit long de 3 à 12 cm, orange à maturité, ellipsoïdal, s'ouvrant selon 3 fentes pour laisser apparaître plusieurs graines noyées dans une pulpe rouge. Probablement introduit pour ses fruits comestibles.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

pupuruvi, fuka, totoma tinito pupuruvi, fuka, totoma tinito

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Nom scientifique

Morinda citrifolia

Rubiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

morindier, pomme-chien, noni

Noms anglais

Indian mulberry, noni

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Morinda citrifolia

Ligneux ramifié atteignant jusqu'à 10 m de haut et 40 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, ovales, de 15-31 cm de long sur 7-12 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de 30 à 60, blanches, comportant un tube long de 1 cm et de 5 pétales longs de 4 mm ; drupe composée ovoïde de 10 cm de long sur 6 cm de large, jaunâtre à blanc translucide à maturité, exhalant une odeur très forte, et comprenant plusieurs dizaines de graines. Employée en médecine traditionnelle pour ses feuilles, stipules, fruits, écorce et racine ; racines produisant une teinture jaune.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

ABONDANCE


Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Commun	Commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Commun	Commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
noni	noni	nono
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
nono	nono	nono
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
noni, nono	nono, hora	nono
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
hora	hora, nono	



CHAMBRE D'AQUACULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGOONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Noms français
cerisier de la Jamaïque,
capulin, cerise rose

Noms anglais
Panama berry

Type biologique
Arbre

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Muntingia calabura

Atteignant 15 m de haut et 25 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, entières à marge dentée, étroitement ovale de 3 à 12 cm de long sur 1 à 4 cm de large ; fleurs généralement solitaires à 5 sépales verdâtres, 5 pétales blancs et de nombreuses étamines ; baie rouge à maturité, sphérique, d'un peu moins de 1 cm de diamètre et comprenant de nombreuses graines. Introduit pour son fruit comestible.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
	pu'u manini tai, pu'u manini, manini, manini oneone	
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Murraya paniculata

Atteignant 7 m de haut et 30 cm de diamètre ; feuilles imparipennées comprenant de 3 à 7 folioles longues de 1,5 à 7 cm sur 1 à 2 cm de large ; inflorescence terminale comprenant moins de 10 fleurs odorantes dotées de 5 pétales blancs longs de 12 à 18 mm ; baie ovoïdes rouge à maturité. Introduite pour son feuillage sempervirent et ses fleurs blanches odorantes.

Noms français

oranger jasmin, buis de Chine

Noms anglais

orange jessamine

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X		
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Maclet (1958)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tiare 'anani	tiare 'anani
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Musa troglodytarum

Musacées

Synonymes

Musa fehi

Taxons concernés



Noms français

plantain de montagne

Noms anglais

mountain plantain

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, forêt hygrophile de haute altitude, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Musa troglodytarum

Herbe charnue dotée d'un stipe atteignant 7 m de hauteur et caractérisée par un régime érigé comportant des bananes orange à maturité. Plante alimentaire majeure dans la Société pour ses bananes à cuire, et possédant quelques usages médicaux ; sève employée en teinture.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

huetu

huetu

fe'i, ve'i, he'i

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

fe'i

fe'i

fe'i

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

'u'ato

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français
bananier

Noms anglais
banana

Type biologique
Herbacée

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Musa x paradisiaca

Herbe charnue dotée d'un stipe atteignant 7 m de hauteur et caractérisée par un régime pendant doté de bananes généralement jaunes. Plante alimentaire de première importance en Polynésie, possédant des usages médicinaux ainsi que comme plats pour contenir de la nourriture.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	


Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
meika	mei'a	mai'a, mei'a, mi'a
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tautau, mei'a	mei'a, mai'a	mei'a, mai'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
meika	mei'a, mai'a, meika	mei'a
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
mei'a, meika	mei'a	





Noms français

mara

Noms anglais

mara

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse altitude, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC

Neonauclea forsteri

Atteignant dépassant 25 m de haut et 1,5 m de diamètre ; feuilles opposées, simples, elliptiques, brillantes, de 10-19 cm de long sur 6-12 cm de large, légèrement ondulées, à marge entière ; fleurs regroupées par centaines en une tête globuleuse, longues de 1 cm et comprenant 5 pétales blancs et un stigmate les dépassant largement ; capsule intégrée dans une tête de 2 cm de diamètre, cette dernière contenant 200 à 300 graines faiblement ailées de 2 mm de long. Prisé pour son bois anciennement employé pour la fabrication de pirogues de guerre, et plus rarement pour ses vertus médicinales.

Nectar Pollen Miellat

Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

mara mara

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Nephelium lappaceum

Sapindacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

ramboutan, litchi chevelu

Noms anglais

rambutan

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X			
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Nephelium lappaceum

Atteignant 20 m de haut et 50 cm de diamètre ; feuilles alternes, paripennées et composées de 2 à 4 paires de folioles opposées ; inflorescences comprenant plusieurs dizaines de fleurs minuscules dépourvues de pétale ; drupe ovoïde de 4 à 8 cm de long, couverte d'épines molles, rouge à maturité et renfermant un arille charnu translucide entourant l'unique graine. Introduit et planté pour ses fruits comestibles très appréciés.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

raitihī taratara

raitihī taratara

Gambier


Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français

laurier-rose

Noms anglais

oleander

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat

Nerium oleander

Atteignant 5 m de haut et doté d'une sève blanche abondante ; feuilles lancéolées longues de 8 à 30 cm sur 1,5 à 3 cm de large ; inflorescences regroupant une dizaine de fleurs ; fleurs au calice à 5 lobes, à la corolle rouge ou rose composée d'un tube de 8 à 12 mm de long et de 5 lobes longs de 2 à 2,5 cm ; fruit sous la forme de 2 follicules longs de 8 à 15 cm. Ornementale.

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun


NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pua pukiki	pua pukiki	tarona

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tarona	tarona	tarona

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tarona	tarona	tarona

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
tarona	tarona





Noms français
basilic, basilic commun

Noms anglais
sweet basil

Type biologique
Arbrisseau

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Lande sèche, zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Ocimum basilicum

Plante ligneuse buissonnante atteignant 1 m de hauteur, aux feuilles agréablement odorantes, lancéolées et aux fleurs roses, lilas ou blanches. Plante de première importance pour les bouquets parfumés et le monoï ainsi qu'en médecine et notamment certains usages médico-magiques.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mini, mine keka'a, mine vae	mine keka'a, mine, mine ku'a	miri, miri no'ano'a, migi, migi no'ano'a
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	miri, miri tahiti	miri, miri tahiti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tamore	miri	miri

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun



Tuamotu Centre	Tuamotu Est
miri	miri



Noms français

basilic sauvage, basilic de Nouvelle-Calédonie

Noms anglais

wild basil

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, zones cultivées, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Ocimum gratissimum

Plante ligneuse aux feuilles fortement odorantes, pouvant atteindre plus de 2 m de hauteur et couvrir densément d'importantes superficies. Plante peu utilisée en cosmétique en raison de sa trop forte odeur mais parfois employée en médecine notamment en soins oculaires.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
mini kaipeka, mine hio, mine kaipeka	mine fio, mine tuhia	miri taetaevao, miri 'aihere, miri 'oviri, migi taetaevao
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	miri taratoni, miri papa'a	miri taratoni, miri papa'a
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tamore vao	miri papa'a	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

*Odontonema
cuspidatum*

Acanthacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Odontonema

Noms anglais

mottled toothedthread

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Odontonema cuspidatum

Atteignant 2,5 m de haut ; feuilles de 7 à 20 cm de long sur 4 à 10 cm de large, ovales à elliptiques ; inflorescences longues de 10 à 40 cm comprenant plusieurs dizaines de fleurs dotées d'une corolle rouge dont le tube atteint 2 à 3 cm de long et les 5 lobes 2 à 3 mm. Ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Oxalis barrelieri

Oxalidacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

oxalis de Barrelier

Noms anglais

Barrelier's woodsorrel

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Pistes agricoles et forestières, zones cultivées, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Oxalis barrelieri

Atteignant 80 cm de haut ; feuilles trifoliées aux folioles oblongs à elliptiques de 1 à 3,5 cm de long sur 1 à 2,5 cm de large, rougeâtres sur la face inférieure ; fleurs dotées de 5 pétales roses de 7 à 9 mm de long ; capsules ovoïdes de 5 à 10 mm de long sur 2 à 5 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent


Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Pandanus tectorius

Stipe atteignant 12 m de hauteur et 20 cm de diamètre, soutenu par des racines aériennes dépassant 1 m de long ; feuilles simples, linéaires, de 1,0 à 1,7 m de long sur 6 à 8 cm de large, à marges dotées de nombreuses épines ; fleurs mâles odorantes regroupées par centaines sur des épis cylindriques masqués par des bractées blanches de 30 cm de long ; fleurs femelles regroupées par 40 à 120 sous la forme de têtes globuleuses solitaires vertes de 15 à 20 cm de diamètre ; drupe charnue anguleuse, jaune, orange à rouge à maturité, de 5 à 5,5 cm de long sur 2,5 à 4,0 cm de large, comportant 5 à 7 graines soudées au sein d'une coque épaisse . Nombreux usages, dont la vannerie avec les feuilles, la médecine avec les racines aériennes et la cosmétique avec les fruits et les inflorescences mâles.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

Noms français

vacoa, pandanus

Noms anglais

screwpine, pandanus

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de haute altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X			

Nectar Pollen Miellat


X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très commun	Très commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Peu commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Très commun	Très commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très commun	Très commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ha'a	fa'a	fara, 'ara, haga
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
kai'ara, fara	fara	fara
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
'ara, pu'ara, mokorea	fara, tima	fara
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
fara, tima	fara, tima, viri	



Noms français
fruit de la passion,
barbadine, grenadille
pourpre

Noms anglais
passionfruit

- Type biologique
Liane grimpante
- Statut biogéographique
Introduction moderne
- Degré de naturalisation
Subspontanée
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Passiflora edulis

Liane grimpante atteignant plus de 10 m de long ; feuilles dentées, entières ou trilobées ; présence de vrilles ; fleurs solitaires dotées de 5 sépales verdâtres et de 5 pétales blancs ; nombreux filaments issus du réceptacle de couleur rose ou pourpre et blanc : baies sphériques ou ovoïdes de 3,5 à 6 cm de diamètre, jaunes à pourpres à maturité. Introduite pour ses fruits comestibles.

Nectar	Pollen	Miellat

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	parapautini, para, parapatini	parapautini, para, parapatini

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
parapatini	parapatini	parapatini

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
parapatini	parapatini



Nom scientifique

Passiflora foetida

Passifloracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

liane poc-poc

Noms anglais

love-in-a-mist

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, zones
habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Passiflora foetida

Liane grimpante atteignant 5 m de long ; feuilles trilobées de 2,5 à 7 cm de long sur 2 à 6 cm de large, à odeur fétide ; présence de vrilles ; fleurs solitaires de 3 à 5 cm de large, dotées de 5 sépales blancs et de 5 pétales blancs ; nombreux filaments issus du réceptacle de couleur lavande ou pourpre et blanc : baies sphériques de 1,8 à 2,8 cm de diamètre, jaunes ou rouges à maturité. Introduite pour ses fruits comestibles.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très commun	Très commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Peu commun	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
puku manini, pu'u manini, kaheahea, koko'u	pu'u mo'ina, papakakina	
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
		para
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

*Passiflora
laurifolia*

Passifloracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

grenadille jaune, pomme
liane

Noms anglais

yellow granadilla

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt hygrophile de basse
altitude, zones habitées,
zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Passiflora laurifolia

Liane grimpante atteignant plus de 10 m de long ; feuilles entières, oblongues, de 6 à 14 cm de long sur 4 à 6,5 cm de large ; présence de vrilles ; fleurs solitaires pendantes de 6 à 8 cm de diamètre et dotées de 5 sépales et de 5 pétales blancs ou maculés de pourpre ; nombreux filaments issus du réceptacle de couleur pourpre et blanc ; baies ovoïdes de 5 à 6 cm de long, jaunes à orange à maturité. Introduite pour ses fruits comestibles.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS


Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

grenadille géante,
barbadine

Noms anglais

giant granadilla

- Type biologique
 - Liane grimpante
- Statut biogéographique
 - Introduction moderne
- Degré de naturalisation
 - Subspontanée
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
 - Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
		X	
MAI	JUN	JUL	AOU
			X
SEP	OCT	NOV	DEC

Passiflora quadrangularis

Liane grimpante atteignant plus de 10 m de long et à la tige quadrangulaire ; feuilles longues de 8 à 18 cm sur 6 à 20 cm de large, ovales, entières ; présence de vrilles ; fleurs solitaires de 7 à 10 cm de large, dotées de 5 sépales et de 5 pétales blancs ou teintés de rose ou pourpre ; nombreux filaments issus du réceptacle de couleur pourpre et blanc : baies ellipsoïdales de 20 à 30 cm de long, vertes à maturité. Introduite pour ses fruits comestibles.

Nectar	Pollen	Miellat
--------	--------	---------

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Rare	Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
	paparati, paraparati, pu'u parapatini	
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	parapautini, parapatini	parapautini, parapatini
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
parapatini		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Pemphis acidula

Lythracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

mikimiki

Noms anglais

Pemphis

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Fourré littoral, forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Pemphis acidula

Atteignant jusqu'à 5 m de haut et 30 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, elliptiques, de 1 à 2,5 cm de long sur 0,5 à 1 cm de large, à marge entière ; fleurs solitaires, portant 6 pétales blancs longs de 4 à 8 mm et 12 étamines ; capsule obovoïde rouge à brune à maturité, de 5 à 10 mm de long et contenant 15 à 20 graines. Bois très dur et lourd, employé dans la confection de certains objets très solides.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.,
Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun Commun Très commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très commun Très commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

mikimiki, 'a'ie,
mitimiti, nanie,
nanie papa

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

'a'ie 'a'ie

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

tupapa 'a'ie, gagie,
mikimiki 'a'ie

Tuamotu Centre Tuamotu Est

giegie, gagie,
mikimiki gagie, giegie, gihia,
mikimiki



Nom scientifique

Pentas lanceolata

Rubiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

bouquet d'étoiles, étoile égyptienne

Noms anglais

pentas

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Pentas lanceolata

Atteignant 1 m de haut ; feuilles lancéolées, ovales à elliptiques, longues de 2 à 12 cm sur 1 à 5 cm de large ; fleurs regroupées par dizaines, généralement de couleur rose-violet, à calice long de 5 à 13 mm, à corolle large de 1,2 cm, dotée d'un tube long de 2 à 4 cm et de 4 à 6 lobes. Ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Rare	Rare

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS


Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
----------------	---------------	----------------

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
------	--------------	-------------------

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------





Noms français

avocatier

Noms anglais

alligator pear, avocado

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse altitudes, forêt hygrophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X			

Persea americana

Atteignant jusqu'à 25 m de haut, doté d'inflorescences aux nombreuses fleurs verdâtres et de fruits ronds, oblongs ou en forme de poire. Cultivé dans les jardins ou dans des plantations pour ses nombreux cultivars aux fruits comestibles ; planté également en montagne.

Nectar Pollen Miellat

X

X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
avoka	avoka	'avota
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
'avota	'avota	'avota
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
avoka	avoka	avoka
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
avoka	avoka	



Nom scientifique

*Phyllanthus
acidus*

Phyllanthacées

Synonymes

Cicca distichus

Taxons concernés



Noms français

seurettier, surette, groseiller
de Tahiti, chérambolier

Noms anglais

Otaheite gooseberry

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
			X
SEP	OCT	NOV	DEC
X			

Phyllanthus acidus

Atteignant 10 m de hauteur et 40 cm de diamètre ; feuilles simples, entières, disposées sur des rameaux caducs terminant les branches, ovales, de 3 à 9 cm de long sur 2 à 4,5 cm de large ; inflorescences comprenant de nombreuses fleurs ; fleurs femelles et fleurs mâles roses de 2 mm de diamètre ; fruit jaune pâle sous la forme d'une baie anguleuse de 1 à 2 cm de diamètre. Introduite pour ses fruits comestibles.

Nectar Pollen Miellat

Maclet (1958), Oudart (2015), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Rare	Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
----------------	---------------	----------------

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	mamara	mamara

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Physalis peruviana

Solanacées

Synonymes

Physalis edulis

Taxons concernés



Noms français

groseiller du Cap,
coqueret du Pérou,
alkékenge

Noms anglais

Cape gooseberry

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Physalis peruviana

Atteignant 1 m de haut, aux rameaux pubescents ; feuilles alternes, simples, ovales, de 6 à 10 cm de long sur 4 cm de large ; fleurs solitaires au calice doté de 5 lobes de 1 cm de long et à la corolle jaune avec des marques pourpres de 1,5 à 2 cm de large ; baies jaunes pales de 1,5 à 2 cm de diamètre, encloses dans une poche. Introduite pour ses fruits comestibles.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

tupere,
maupere

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

tupere

tupere

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

maru, maupere

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Pisonia grandis

Nyctaginacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

arbre à chou, pisonia

Noms anglais

cabbage tree, pisonia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Pisonia grandis

Atteignant plus de 30 m de haut et 3 m de diamètre, à l'écorce lisse claire et aux racines formant des trottoirs ; feuilles opposées, simples, ovales, vert clair, de 18 cm de long sur 8 cm de large, à marge entière ; fleurs mâles et fleurs femelles sur des pieds distincts ou identiques, regroupées par dizaines, portant une corolle blanchâtre de 3 à 5 mm de long et dotée de 5 lobes ; fruit en forme de bâtonnet de 8 à 15 mm de long sur 5 mm de large, portant des épines collantes, brun à noir à maturité, comportant une unique graine. Jeunes feuilles comestibles à l'état cru ; feuilles et écorces aux propriétés médicinales ; bois léger et peu durable parfois employé.

Oudart (2015)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Très rare	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pukatea, pu'atea	pu'atea	pu'atea, pu'a, pateia
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pu'atea	pu'atea
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	pu'atea, pukatea, puka, gatae	pu'atea
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
gatae, puka	pukatea, puka, gatae, mahame, toatoa	



Nom scientifique

*Pittosporum
taitense*

Pittosporacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

pittosporum

Noms anglais

pittosporum

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Endémique de la Société

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC

Ecologie

Forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de moyenne et haute altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Pittosporum taitense

Atteignant jusqu'à 12 m de haut et 40 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, elliptiques, de 10-15 cm de long sur 2-4 cm de large, à marge entière et à odeur agréable lorsque pressé ; fleurs par groupes de 10 à 25, comportant 5 pétales blancs partiellement soudés et longs de 10 mm ; capsule orange à maturité s'ouvrant par 2 valves pour laisser apparaître quelques dizaines de graines noyées dans une pulpe collante. Feuilles anciennement employées dans la confection de monoi.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

ofeo ofeo

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

plumbago

Noms anglais

Cape leadwort, plumbago

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Plumbago auriculata

Arbrisseau plus ou moins lianescent atteignant 3 m de haut ; feuilles ovale de 5 cm de long sur 2 cm de large ; inflorescences terminales comprenant une dizaine de fleurs bleues de 3 cm de long ; calice portant des glandes permettant l'accrochage des fleurs sur d'autres supports. Plante introduite pour ses propriétés ornementales.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Nom scientifique

Plumeria obtusa

Apocynacées

Synonymes

Plumeria obtusa var. *obtusa*

Taxons concernés



Noms français

frangipanier

Noms anglais

frangipani, plumeria

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Plumeria obtusa

Petit arbre partiellement décidu, au tronc couvert de protubérances noueuses, feuilles vert foncé oblongues à l'apex obtus, fleurs blanches. Plante ornementale typique des jardins et des cimetières dans toute la Polynésie ; fleurs odorantes très recherchées pour les couronnes.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Commun

Commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Peu commun

Peu commun

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Peu commun

Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

tipanie

tipanie

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

tipanie

tipanie

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

tipanie

tipanie

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

tipanie

tipanie



Nom scientifique

Plumeria rubra

Apocynacées

Synonymes

Plumeria rubra f. *acutifolia*

Taxons concernés

Noms français

frangipanier

Noms anglais

frangipani, plumeria

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Plumeria rubra

En forme de candélabre, aux feuilles décidues elliptiques à l'apex effilé et de couleur vert terne, fleurs odorantes diversement colorées. Plante ornementale aux fleurs très recherchées pour la confection de couronnes et de monoï ; latex utilisé pour brûler les verrues.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
tipanie	tipanie	tipanie
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tipanie	tipanie	tipanie
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tipania	tipanie	tipanie
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
tipanie	tipanie	



Nom scientifique

Podocarpus chinensis

Podocarpacees

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Podocarpe chinois

Noms anglais

Chinese podocarp

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	
SEP	OCT	NOV	DEC

Podocarpus chinensis

Atteignant 6 m de haut et 30 cm de diamètre, à écorce grise se desquamant en plaques ; feuilles sessiles, étroites, obovales-lancéolées longues de 3 à 7,5 cm de long sur 6 mm de large ; cônes mâles par groupes de 3 à 5 et longs de 3 à 5 cm ; cônes femelles solitaires ; cône mûr sous la forme d'un réceptacle charnu long de 2,5 cm, rougeâtre à violet foncé à maturité, surmonté par une ou deux graines ovoïdes de 1 cm de diamètre.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Très rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

*Polyscias
scutellaria*

Araliacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

faux-caféier

Noms anglais

large-leaf panax

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
			X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Polyscias scutellaria

Ligneux au port colonnaire pouvant atteindre 6 m de haut, aux feuilles comprenant généralement 3 folioles circulaires gaufrées. Plante ornementale pour ses feuilles charnues de couleur vert foncé et son port colonnaire idéal pour former certaines haies.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Peu commun

Peu commun

Peu commun

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Peu commun

Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
----------------	---------------	----------------

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés


Tuamotu Ouest

fokafie

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français
litchi du Pacifique,
pometier

Noms anglais
Pacific lychee

Type biologique
Arbre

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse altitude, forêt hygrophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X		
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Pometia pinnata

Atteignant jusqu'à 20 m de haut, à l'écorce de teinte rosée, aux feuilles paripennées et aux fruits ronds, lisses et verts à maturité. Cultivé pour son fruit comestible, le litchi du Pacifique, et dans une moindre mesure pour son bois d'ébénisterie de qualité.

Nectar	Pollen	Miellat
X		

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kava, tava	pu'u manini, tava, kava	kava, tava

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tava, kava	tava, kava

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kava	kava	kava

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
kava	kava





Noms français
pourpier d'Océanie

Noms anglais
Pacific pigweed

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale, forêt littorale,
fruticée de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Portulaca lutea

Plante charnue terrestre ou saxicole, de moins de 50 cm de haut, à la tige charnue, verte à rouge, de 1 à 5 cm de diamètre, et aux racines tubérisées ; feuilles opposées, simples, charnues, obovales, de 2 à 3 cm de long sur 1 à 2 cm de large, à marge entière ; fleurs solitaires ou par groupes de 3, portant 5 pétales jaunes lobés au sommet, de 9 à 12 mm de long, et plusieurs dizaines d'étamines ; capsule charnue ovoïde, verte, de 8 mm de long sur 5 mm de large, comprenant une dizaine de graines noires. Racines, tiges et feuilles étaient autrefois consommées par l'homme, notamment aux Tuamotu où la

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Rare	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Commun	Commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Commun	Commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pokea	pokea	'aturi

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'aturi	piripapa, piripapa motu

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pokea	pokea, po'ea	po'ea

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
pokea	pokea



Nom scientifique

Portulaca oleracea

Portulacacées

Synonymes

Portulaca oleracea 'Wildfire'

Taxons concernés



Noms français

pourpier des jardins,
pourpier commun

Noms anglais

weedy pigweed

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones
cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Portulaca oleracea

Plante charnue terrestre ou saxicole, généralement prostrée, à la tige rougeâtre et aux petites fleurs jaunes possédant peu d'étamines. Bien que toute la plante puisse être consommée par l'homme, elle est généralement destinée à nourrir les cochons domestiques.

Nectar Pollen Miellat

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pokea	pokea	ma'a pua'a, pa'apa'a'ina
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'aturi	piripapa
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pokea	pokea, po'ea	po'ea
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
pokea	pokea	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Noms français

sureau polynésien

Noms anglais

Premna shrub

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Fourré sec, forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitude, forêt hygrophile de moyenne altitude

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Premna serratifolia

Arbuste sarmenteux à arbre atteignant jusqu'à 10 m de haut et 40 cm de diamètre, au bois durable; feuilles opposées, simples, ovales à elliptiques, de 6 à 12 cm de long sur 4 à 8 cm de large, à marge dentée, entière ou sinueuse ; fleurs par groupes de plusieurs dizaines jusqu'à plusieurs centaines, verdâtres, faiblement odorantes, portant un tube de 2,5 mm de long et 4 lobes inégaux longs de 1 à 1,5 mm ; drupe charnue globuleuse de 3 à 7 mm de diamètre, noire à maturité et comprenant 4 graines incluses dans une unique coque. Plante médicinale importante dans plusieurs archipels et dont les inflorescences

Butaud, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
va'ova'o	va'ova'o	vavaro, 'avaro, 'avago, 'upa

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'avaro	'avaro

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
varovaro	'avaro	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Pseudelephantopus spicatus

Astéracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

faux tabac des Samoa

Noms anglais

false elephant's-foot

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, zones habitées, zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Pseudelephantopus spicatus

Atteignant 60 cm de haut ; feuilles tout le long de la tige, aux limbes jusqu'à 18 cm de long sur 5 cm de large, oblancéolées ; groupes de plusieurs têtes portés par des pédoncules plus ou moins longs ; têtes composées de 4 fleurs ; corolles blanches de 7 mm de long ; akènes de 5 à 6 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES


ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
fikitu, pikitu, titania	fikitu	
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'aihere 'ava'ava	'aihere 'ava'ava, 'ava'ava ha'avare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
'ava'ava ha'avare		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	





Noms français
goyavier, goyavier tahitien

Noms anglais
common guava

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Fourré sec, forêt sèche, zones cultivées, zones habitées, forêt mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Psidium guajava

Atteignant 10 m de haut, au port oblique, à l'écorce de couleur brun-vert à orangé et aux fruits jaunes contenant une chair rose. Introduit pour ses fruits comestibles, le goyavier a été incorporé à la pharmacopée polynésienne ; son bois flexible est également utilisé.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Commun

Commun

Commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
------	--------------	-------------------

Commun

Commun

Commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Peu commun

Peu commun

Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

Peu commun

Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

tuava

tuava

tuava, tuvava, tuava tahiti

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
------	--------------	-------------------

tuava, tuvava, tuava maite

tuava, tuvava, tuava tahiti

tuava, tuvava, tuava tahiti

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

tuvava, tuava

tuava

tuava

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

tuava

tuava





Noms français
goyavier du Brésil

Noms anglais
guava

Type biologique
Arbuste

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones cultivées, fourré
mésophile

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X		

Psidium guineense

Atteignant 6 m de haut et 20 cm de diamètre ; feuilles jusqu'à 12 cm de long, ovales à oblongues-elliptiques, présentant une pubescence rousse sur la face inférieure ; fleurs blanches solitaires ou par groupes d'une demi-douzaine, dotées de nombreuses étamines ; fruit ovoïde de moins de 5 cm de diamètre, jaune pâle à maturité. Introduit pour ses fruits comestibles.

Nectar	Pollen	Miellat
X		

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Commun	

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------


Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
	tuava kina	

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tuava papa'a	tuava papa'a

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Pterocarpus indicus

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

sandragon, sang dragon, bois de corail

Noms anglais

narra, Amboyna wood

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Plantations forestières, zones d'élevage bovin, forêt hygrophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Pterocarpus indicus

Atteignant 30 m de haut et plus de 80 cm de diamètre, au bois rouge sang ; feuilles alternes, décidues, imparipennées et composées de 5 à 13 folioles alternes ; inflorescences ramifiées comportant plusieurs dizaines de fleurs jaune à jaune orange à corolle papilionacée ; gousse indéhiscente, aplatie, ovale, dotée d'une aile sur son pourtour, de 5 à 6 cm de diamètre, brune à maturité et comportant 1 à 2 graines. Arbre planté pour son bois ou plus souvent comme poteau de clôture à cause de son bouturage aisé.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Rhodomirtus tomentosa

Myrtacées

Synonymes



Taxons concernés



Noms français

feijoa, myrte groseille

Noms anglais

rose myrtle, downy myrtle

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Fourré hygrophile de moyenne altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Rhodomirtus tomentosa

Atteignant 4 m de haut ; feuilles opposées, simples, ovales à elliptiques de 5 à 8 cm de long ; fleurs solitaires dotées de 5 pétales roses et de nombreuses étamines rouges ; baie charnue globuleuse de 1 cm de diamètre, violette à maturité et comprenant une quarantaine de graines noyées dans la pulpe. Introduit pour son fruit comestible.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Très rare Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

féjoa féjoa

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

Rhus tahitien

Noms anglais

Tahitian Rhus

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de moyenne altitude, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
			X

Rhus taitensis

Arbre atteignant 25 m de haut et 1 m de diamètre ; feuilles alternes, composées de 13 à 21 folioles, chacune mesurant de 8 à 15 cm de long sur 2 à 4 cm de large, à marge entière ; fleurs regroupées par centaines, de 2 mm de long, portant 5 pétales blancs millimétriques et 5 à 10 étamines ; drupe noire à maturité, de 2 à 4 mm de diamètre et comprenant une unique graine. Le bois était autrefois employé.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Très rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

'apape, 'avai

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

rosier, rose

Noms anglais

rose

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Rosa spp.

Atteignant 1,5 m de haut et dotées d'épines ; feuilles imparipennées dotées de folioles dentées ; fleurs odorantes généralement doubles et possédant donc des multiples de 5 pétales, généralement roses à rouges en Polynésie, de 5 à 10 cm de diamètre ; fruits généralement non formés en Polynésie.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Rare	Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
roi	roi	roti
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
roti	roti	roti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
roti	roti	roti
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
roti	roti	

Nom scientifique

Roystonea regia

Arécacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

palmier royal

Noms anglais

Cuban royal-palm

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X		
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Roystonea regia

Atteignant 20 à 25 m de haut et 50 cm de diamètre ; palmes pennées longues de 3,5 m et possédant une gaine verte de 2 m appliquée le long du stipe ; inflorescences ramifiées comprenant des centaines de fleurs blanc-jaunâtre ; fruits globuleux, rouges puis noirs à maturité, de 1 cm de diamètre. Ornementale.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Rubus rosifolius

Rosacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

framboisier

Noms anglais

thimbleberry, roseleaf raspberry

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Forêt hygrophile de basse, moyenne et haute altitudes, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Rubus rosifolius

Atteignant 2 m de haut, aux rameaux couverts d'épines ; feuilles composées de 5 à 7 folioles lancéolées et à marge dentée ; fleurs solitaires de 1 à 2 cm de diamètre, dotées de 5 pétales blancs ; framboise rouge à maturité, de 2 à 3,5 cm de long. Introduite pour ses fruits comestibles.

Nectar Pollen Miellat

X X

Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

monamona rahipere rahipere

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

maupere

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Salvia coccinea

Lamiacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

sauge rouge

Noms anglais

red sage

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, fruticée de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Salvia coccinea

Atteignant 80 cm de haut, aux tiges et feuilles très odorantes ; feuilles de 2 à 7 cm de long sur 1 à 3 cm de large, ovales et poilues ; fleurs regroupées en 3 à 6 verticilles ; corolle rouge de 2,5 à 3 cm de long dont 13 à 17 mm de tube ; graines de 2,5 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Très rare

Très rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

'eita koima'a

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

taravia

taravia

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

miri

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français

arbre à pluie, bois noir d'Haïti, arbre des avenues

Noms anglais

monkeypod, rain tree

Type biologique
Arbre
Statut biogéographique
Introduction moderne
Degré de naturalisation
Subspontanée
Statut réglementaire
Statut UICN
Ecologie

Zones d'élevage, zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
			X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Samanea saman

Atteignant près de 30 m de haut et plus de 1 m de diamètre, avec une écorce brune se desquamant en nombreuses plaques ; feuilles alternes, composées bipennées et comprenant 4 à 8 paires de pennes portant chacune 2 à 10 paires de folioles ; inflorescences composées de plusieurs capitules associant plusieurs dizaines de fleurs caractérisées par leurs nombreuses étamines blanches et roses aux extrémités ; gousse noire à maturité de 15 à 20 cm de long. Arbre cultivé pour son ombrage et son bois communément employé en menuiserie.


Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
marumaru	marumaru	ra'au marumaru
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	ra'au marumaru	ra'au marumaru
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
paina, marumaru	ra'au marumaru	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Noms français
santal de Polynésie

Noms anglais
Polynesian sandalwood

Type biologique
Arbre

Statut biogéographique
Endémique de Polynésie

Degré de naturalisation

Statut réglementaire
Protégée

Statut UICN
VU - EN

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de moyenne et haute altitudes, forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
--------	--------	---------

Santalum insulare

Petit arbre atteignant 13 m de haut et 40 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, ovales à elliptiques, de 9 cm de long sur 5 cm de large, à marge entière ; fleurs regroupées par dizaines, de 4 à 7 mm de large, odorantes et dotées de 4 pétales triangulaires blanchâtres à bruns ; drupe charnue rouge, violette à noire à maturité, globuleuse, de 1,7 à 4,8 cm de diamètre, comprenant une unique graine de 0,9 à 3,4 cm de diamètre. Bois de cœur très employé en cosmétique pour parfumer le monoï mais également en médecine traditionnelle pour ses vertus antiseptiques.

Ramage (2019), Butaud, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Très rare	Rare	Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
puahi	puahi	ahi
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
a'i	ahi	ahi
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Sapindus saponaria

Sapindacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

savonnier polynésien

Noms anglais

Polynesian soapberry

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt sèche, forêt mésophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Sapindus saponaria

Atteignant dépassant 15 m de haut et 50 cm de diamètre ; feuilles alternes, composées de 7 à 13 folioles elliptiques longues de 6-16 cm et larges de 2-4,5 cm, à marge entière ; fleurs regroupées par centaines, dotées de 5 pétales blanchâtres de 2 mm de long et 5 étamines pour les fleurs mâles et d'un stigmate pour les fleurs femelles ; drupe charnue, globuleuse de 1,5 à 2 cm de diamètre, orange translucide à maturité, comprenant une unique graine noire de 1 cm de diamètre. Plante médicinale mais également cosmétique pour traiter les odeurs corporelles ; bois parfois utilisé pour divers ustensiles ; graines employées dans la

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Très rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Très rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

koku'u

koku'u

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

a'ea'e

a'ea'e

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

kokuru, tutae
kiore

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Saraca indica

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

ashoka

Noms anglais

asoka

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
			X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Saraca indica

Atteignant 8 m de hauteur et plus de 30 cm de diamètre ; feuilles paripennées comportant 3 à 7 paires de folioles de 15 à 30 cm de long sur 1,5 à 2 cm de large ; inflorescences jusqu'à 25 cm de large comprenant plusieurs fleurs jaunes à rouge-brique ; gousse aplatie. Introduit pour ses superbes inflorescences ornementales.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Très rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

Scaevola

Noms anglais

half-flower shrub, sea-
lettuce shrub, Scaevola

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale, forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Scaevola taccada

Plante sarmenteuse atteignant jusqu'à 4 m de haut et 15 cm de diamètre, à port arbustif ou sarmenteux ; feuilles alternes, simples, obovales, brillantes, de 10 à 12 cm de long sur 5 à 7 cm de large, à marge entière sauf à l'apex où elle est parfois dentée ; fleurs par groupes de 3 à 5, dotées d'un calice vert à 5 dents et d'une corolle blanche, rarement violette, divisée en 5 pétales tournés du même côté de 8 à 12 mm de long ; drupe charnue globuleuse blanche à maturité, de 10 à 13 mm de long sur 5 à 7 mm de large, comprenant une unique graine. Plante médicinale, notamment les feuilles pour traiter la ciguatera et les fruits pressés en collyre dans les yeux.

Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat


X X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très rare	Très rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Très commun	Très commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très commun	Très commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		panau, 'io'uru, naupata, 'io'ugu, 'io'ugu papa
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	naupata	naupata
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
naupata	'apata, gapata	'apata
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
gapata, kopapa	gapata, kopapa	



Noms français

baie rose, poivre rose, poivrier du Brésil, faux-poivrier

Noms anglais

Brazilian pepper tree, Christmas berry

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Schinus terebenthifolius

Atteignant 2 à 8 m de haut ; feuilles alternes composées de 2 à 6 paires de folioles elliptiques ; inflorescences comptant plusieurs dizaines de fleurs blanchâtres de 1 à 2 mm de diamètre ; baies charnues rondes de 4 à 6 mm de diamètre, rouges vif à maturité. Introduit pour ses baies employées comme condiment.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	X

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Sechium edule

Cucurbitacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

chouchoutte, chayotte, christophine

Noms anglais

choko, choyote

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
		X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC

Sechium edule

Liane grimpante ou rampante longue de plusieurs mètres ; feuilles ovales longues de 10 à 20 cm, anguleuses et peu lobées ; fleurs à corolle blanchâtre divisée en 5 lobes ; fruit en forme de poire de 8 à 20 cm de long, verdâtre à blanchâtre à maturité, renfermant une unique graine de 2,5 à 5 cm de long.

Maclet (1958), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar

Pollen

Miellat

X

ABONDANCE

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Senna alata

Fabacées

Synonymes

Cassia alata

Taxons concernés



Noms français

dartrier

Noms anglais

candle bush

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, zones habitées, zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Senna alata

Atteignant 3 m de haut au port buissonnant ; feuilles alternes composées de 6 à 14 paires de folioles longues de 5 à 15 cm de long ; inflorescences de 30 à 70 cm de long comprenant des dizaines de fleurs dotées de 5 pétales jaunes ; gousse tétragonale, ailée au niveau des fentes, de 11 à 19 cm de long. Introduite pour ses floraisons ornementales.

Nectar

Pollen

Miellat

X

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Senna surattensis

Fabacées

Synonymes

Cassia surattensis

Taxons concernés



Noms français
cassia glauque

Noms anglais
scrambled eggs

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Senna surattensis

Atteignant 6 m de haut et 15 cm de diamètre ; feuilles alternes composées de 6 à 10 paires de folioles longues de 2,5 à 4,5 cm ; inflorescences comprenant de 5 à 21 fleurs dotées de 5 pétales jaunes ; gousse aplatie de 7 à 10 cm de long sur 1 à 1,5 cm de large. Cultivé pour ses qualités ornementales.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

*Sesbania
coccinea subsp.
atollensis*

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

sesbania polynésien

Noms anglais

Polynesian sesbania

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Endémique de Polynésie

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Protégée

Statut UICN

VU - EN - CR

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Sesbania coccinea subsp. atollensis

Ligneux dressé et peu ramifié, atteignant jusqu'à 6 m de haut et 20 cm de diamètre ; feuilles alternes, composées de 20 à 32 folioles ovales à elliptique, de 2 à 5 cm de long sur 1 à 1,5 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de 5 à 10, dotées d'une corolle jaune, orange à rouge, se divisant en 5 pétales inégaux de 3 à 5 cm de long ; gousse brune légèrement courbée de 15 à 25 cm de long sur 4 à 8 mm de large, contenant 20 à 30 graines. Ses inflorescences étaient employées comme parures dans la chevelure ; elle était cultivée pour ses fleurs et son ombrage près des fare.

Butaud, obs. pers.

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Très rare

Très rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Très rare

Très rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

Rare

Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

kohai

kohai

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

'ofai

'ofai

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

kofai

kofai, faifai


Tuamotu Centre

Tuamotu Est

kofai, kohai

kofai, kohai





Noms français
herbe à balais

Noms anglais
broom weed

Type biologique
Arbrisseau

Statut biogéographique
Introduction polynésienne

Degré de naturalisation
Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Lande sèche, zones
habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Sida rhombifolia

Atteignant 1 à 2 m de haut ; feuilles étroitement elliptiques de 3 cm de long sur 1 cm de large, à marge dentée ; fleurs solitaires à 5 sépales verts et 5 pétales orange de 6 à 10 mm de long ; fruit sec de 3 mm de haut sur 5 mm de large, comprenant plusieurs graines. Employée comme herbe à balais.

Nectar	Pollen	Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare		

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
hopa	hopa, teita purumi	tita purumu, 'aihere poromu, pugumu, 'aihege pugumu
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
purumu	'aihere purumu, 'aihere poromu, 'aihere puromu	'aihere purumu, 'aihere poromu, 'aihere puromu
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kovai 'iva	porumi, poromu	poromu



Nom scientifique

*Sidastrum
paniculatum*

Malvacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Sidastrum

Noms anglais

Sidastrum

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Sidastrum paniculatum

Atteignant 3 m de haut ; feuilles ovales de 8 cm de long sur 5 cm de large à marge dentée ; inflorescences dépassant 25 cm de long et comprenant de nombreuses fleurs à calice vert et dotées de 5 pétales pourpres de 5 mm de long sur 3 mm de large ; fruit sec de 3 mm de haut sur 5 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

puehu pare, pare

hopa, teita
purumi

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français

tomate

Noms anglais

tomato

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Solanum lycopersicum

Herbe plus ou moins lianescente atteignant 2 m de long ; feuilles pennatifides à imparipennées de 15 à 45 cm de long, à marge irrégulièrement dentées ; inflorescences de 3 à 15 fleurs jaunes larges de 12 à 20 mm ; fruits principalement rouges de 2 à 10 cm de diamètre.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
tomati	tomati	tomati
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
tomati	tomati	tomati
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
tomati	tomati	tomati
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
tomati	tomati	

Nom scientifique

*Spathodea
campanulata*

Bignoniacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

tulipier du Gabon, pisse-
pisse

Noms anglais

African tulip tree, flame
tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse et
moyenne altitudes, forêt
hygrophile de basse et
moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Spathodea campanulata

Atteignant plus de 30 m de haut et 80 cm de diamètre, à écorce lisse et beige ; feuilles opposées, imparipennées, longues de 25 à 50 cm et composées de 5 à 19 folioles opposées ; fleurs réunies par dizaines en racèmes terminaux et caractérisées par une corolle en tube oblique de couleur orange de plus de 10 cm de long ; capsules de 20 cm de long sur 5 cm de diamètre comprenant des centaines de graines ailées. Plante introduite pour ses qualités ornementales.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.,
Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Très rare Très commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

tiare 'ura tiare 'ura

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

pisse-pisse

Tuamotu Centre Tuamotu Est



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAOONAIRES
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique	<i>Sphagneticola trilobata</i>	Astéracées
Synonymes	<i>Wedelia trilobata</i>	
Taxons concernés		



Noms français

wédélia

Noms anglais

Singapore daisy, wedelia daisy

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, pistes agricoles et forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Sphagneticola trilobata

Liane rampante s'enracinant au niveau des nœuds de la tige, les rameaux florifères se redressant ; feuilles elliptiques de 4 à 9 cm de long sur 1 à 5 cm de large, dentées ; involucre de 1 cm de haut porté par un pédoncule de 3 à 10 cm de long ; 8 à 13 fleurs en languette par tête, la languette jaune longue de 6 à 15 mm ; fleurs en tube de 4 à 5 mm de long ; fruits non formés en Polynésie. Introduite comme couverture des talus routiers et des terrassements.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Commun Commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Commun Commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Commun Rare Rare

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très rare Très rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

tita tamaurepo

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

pomme-cythère, pommier de Cythère

Noms anglais

Otaheite apple

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt mésophile de basse altitude, forêt hygrophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
			X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Spondias dulcis

Atteignant près de 30 m de haut, au tronc gris et lisse, perdant ses feuilles en saison sèche et produisant des fruits jaunes à maturité. Apprécié pour ses fruits consommés verts ou mûrs ; plante médicinale pour son écorce, ses fruits verts et ses jeunes rameaux feuillés.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
vi farani	vi tahiti, vi	vi tahiti, vi taratara, vi
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
vi tahiti	vi, vi tahiti	vi, vi taratara, vi puotaratarara, vi putatarara, vi 'ava'ava
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
vi	vi tahiti	vi tahiti
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
vi tahiti	vi tahiti	



Nom scientifique

Spondias mombin

Anacardiaceae

Synonymes



Taxons concernés



Noms français

mombin

Noms anglais

yellow mombin, hog plum

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X			
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	X

Spondias mombin

Atteignant plus de 25 m de haut et 80 cm de diamètre, à écorce parsemée de protubérances irrégulières ; feuilles composées, imparipennées, alternes, comprenant de 9 à 15 folioles lancéolées à elliptiques ; inflorescences terminales comprenant des fleurs mâles, femelles et hermaphrodites ; fleurs à 5 sépales verdâtres et 5 pétales blancs longs de 3 mm et 10 étamines ; drupes ovoïdes orange à maturité, de 2 à 4 cm de long. Cultivé pour ses fruits comestibles et desquels un alcool était autrefois tiré.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun		
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	mopae	mopae
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Stachytarpheta cayennensis

Verbénacées

Synonymes

Stachytarpheta urticifolia

Taxons concernés



Noms français

fausse verveine, herbe bleue

Noms anglais

snakeweed, blue rat's-tail

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, zones d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Stachytarpheta cayennensis

Atteignant 1,5 m de haut ; feuilles alternes ou opposées de 2 à 10 cm de long sur 1,5 à 4 cm de large, oblongues à elliptiques, dentées ; fleurs réunies par dizaines au sein d'épis terminaux longs de 15 à 50 cm ; corolle bleu pâle à violet de 8 à 11 mm de long et dotée de 5 lobes.

Maclet (1958), Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
	pua viore, ve'o fai	'aero 'i'ore, 'aegohai
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	'itere	'itere
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
piripiri	'itere	'itere
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Stenotaphrum secundatum

Poacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

chiendent de bord de mer, chiendent de bœuf

Noms anglais

buffalo grass

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale, zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Stenotaphrum secundatum

Herbe rampante s'enracinant au nœuds, atteignant plusieurs mètres de long ; feuilles longues de 10 à 20 cm sur 2,5 à 5 mm de large ; épis aplatis et coriaces ; épillets solitaires ou en paires. Introduite comme gazon.

Nectar Pollen Miellat

X

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Peu commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nom scientifique

Strongylodon macrobotrys

Fabacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

liane de jade

Noms anglais

jade vine

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC

Strongylodon macrobotrys

Liane pouvant atteindre 20 m de long ; feuilles trifoliées aux folioles elliptiques à oblongues de 6 à 15 cm de long ; inflorescences longues de 15 à 90 cm comprenant plusieurs dizaines de fleurs à corolle papilionacée de couleur jade à bleu-vert de 4 à 5 cm de long ; gousse apparemment non formée en Polynésie. Introduite pour ses floraisons ornementales.

Nectar Pollen Miellat

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

pua ninamu pua ninamu

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français

bois matelot

Noms anglais

tassel plant, suriana

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Fourré littoral, forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Suriana maritima

Plante atteignant 4 m de haut et 20 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, obovales, de 3 cm de long sur 5 mm de large, à marge entière ; fleurs en groupes de 3 à 6, dotées de 5 pétales jaunes de 6 mm de long ; fruit composé de 3 à 5 drupéoles ovoïdes, brunâtres à maturité, de 2 à 4 mm de diamètre. Plante faisant partie de la pharmacopée traditionnelle sur les atolls, son bois étant employé à la confection de lances et d'hameçons.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.,
Rodgers (2017)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Commun Très commun Très commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Très commun Très commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

mitimiti, 'o'uru,
'io'uru, nanie,
nanie teitei

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

'o'uru 'o'oru

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

gegie 'o'uru, 'u'u, kuku,
kokuru 'o'uru, 'o'oru

Tuamotu Centre Tuamotu Est

kokuru, kuku, 'u'u gavarivari, kokuru, 'u'u



Nom scientifique

Syzygium cumini

Myrtacées

Synonymes

Eugenia cumini

Taxons concernés



Noms français

jamelonguier, pisse-tache, pistachier

Noms anglais

jambolan, Java plum

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse, moyenne et haute altitudes, forêt de nuages, zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Syzygium cumini

Atteignant 25 m de hauteur et 60 cm de diamètre, à écorce lisse et grise ; feuilles opposées, simples, au limbe coriace elliptique à lancéolé, entier ; inflorescences comportant plusieurs dizaines de fleurs dotées de 4 sépales caducs, de 4 pétales blancs et de nombreuses étamines blanches de 4 à 6 mm de long ; baie ellipsoïdale longue de 2 à 4 cm, pourpre à noire à maturité. Initialement planté pour ses fruits comestibles ; son bois est apprécié en menuiserie mais également pour produire du charbon.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

Nectar Pollen Miellat

X X

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Commun	Peu commun	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Très rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pistai	pistai	purune, pitati, pita, pitate
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pita, pistas	pita, pistas
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pitaka, pitate	pistas	pistas
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
pistas	pistas	



Nom scientifique

Syzygium malaccense

Myrtacées

Synonymes

Eugenia malaccensis

Taxons concernés



Noms français

pomme rouge, pomme rose, pomme d'eau, pommier polynésien

Noms anglais

Malay apple

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, forêt hygrophile de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	

Syzygium malaccense

Atteignant 15 m de hauteur et 40 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples, au limbe subcoriace souvent gallé, elliptique à obovale ; inflorescences se développant directement sur la tige, comprenant une demi-douzaine de fleurs ; fleurs comportant 4 sépales verts, 4 pétales pourpres et plus d'une centaine d'étamines pourpres longues de 1 à 2 cm ; baie obovoïdes rouge, longue de 5 à 7 cm et ne comportant qu'une unique graine ronde. Arbre encore cultivé pour ses fruits comestibles, ainsi que pour son écorce et ses feuilles médicinales.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Très rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Très rare		

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kehika, kehi'a, kehika 'enana, kehi'a pukiki	kehi'a, kehi'a 'enana	fe'i'a ma'ohi, fai'a ma'ohi, 'a'i'a ma'o'i, 'ahi'a tahiti, ha'i'a
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
ka'ika vava'i	'ahi'a, 'ahi'a tahiti	'ahi'a, 'ahi'a tahiti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
ke'ika	'ahi'a	'ahi'a
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
'ahi'a		



Nom scientifique

Tagetes spp.

Astéracées

Synonymes

Tagetes patula

Taxons concernés

Tagetes patula, *Tagetes erecta*



Noms français

giroflée, œillet d'Inde

Noms anglais

French marigold

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Tagetes spp.

Atteignant 60 cm de haut, odorante ; feuilles pennées comprenant 2 à 4 paires de folioles elliptiques à étroitement lancéolés, de 1 à 4 cm de long, dentées ; capitules solitaires de 4 à 6 cm de diamètre ; fleurs en languette au nombre de plus de 8, languette jaune pâle à orange de 10 à 30 mm de long ; fleurs en tube nombreuses, jaunes ou orange ; akènes d'environ 1 cm de long. Ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord
Rare Rare Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent
Peu commun Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest
Peu commun Rare Peu commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est
Peu commun Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS


Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent
puamata 'Initia puamata 'Initia

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest
eie

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

tamarinier

Noms anglais

tamarind

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt sèche, forêt mésophile de basse altitude, zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Tamarindus indica

Atteignant 25 m de haut, à l'écorce crevassée, aux feuilles composées et aux gousses de 7 à 15 cm de long contenant une pulpe comestible. Cultivé principalement pour les fruits comestibles de ses différents cultivars mais également comme arbre d'ombrage et plante ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X X

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Rare
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Rare	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
vaioata	tamare, vaioata	tamereni
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tamereni	tamereni
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	tamereni	tamereni
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Nom scientifique

Tecoma stans

Bignoniacées

Synonymes

Stenolobium stans

Taxons concernés



Noms français

tecoma

Noms anglais

yellow bells

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Fourré sec, fruticée de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Tecoma stans

Atteignant 6 m de haut au port souvent retombant ; feuilles composées de 3 à 9 folioles à marge dentée elliptiques à lancéolées ; inflorescences regroupant quelques fleurs jaunes longues de 5 à 7 cm ; capsules de 7 à 20 cm de long comprenant des dizaines de graines ailées. Employée comme tuteur de vanille et parfois en tant qu'ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Commun	Commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Rare	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kohai		piti

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	piti	piti

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	piti	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Tectona grandis

Verbénacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

teck

Noms anglais

teak

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Cultivée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Plantations forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
			X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC

Tectona grandis

Atteignant 30 m de haut et 80 cm de diamètre, à écorce grise faiblement fissurée ; feuilles simples, opposées, au limbe rafeux et largement ovale ; inflorescences comprenant plusieurs centaines de fleurs de 6 à 8 mm de large et à corolle blanche ; drupe arrondie de 0,5 à 2 cm, brune à maturité et contenant une unique graine. Arbre cultivé pour son bois de très bonne qualité, généralement employé pour la marine.

Nectar Pollen Miellat

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Rare Rare

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Peu commun Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

*Tephrosia
purpurea* var.
purpurea

Fabacées

Synonymes

Tephrosia piscatoria

Taxons concernés

Noms français

téphrosie pourpre

Noms anglais

fish-poison pea

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, fruticée de basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X		
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Tephrosia purpurea var. *purpurea*

Atteignant 1,5 m de haut ; feuilles imparipennées divisées en 7 à 15 folioles de 1 à 3 cm de long sur 5 à 10 mm de large ; inflorescences jusqu'à 25 cm de long comprenant une dizaine de fleurs à corolle papilionacée blanche ; gousse beige à maturité, aplatie, légèrement courbée, de 2 à 4,5 cm de long sur 3 à 5 mm de large. Anciennement utilisée comme poison de pêche.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Rare	Très rare	Rare
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Très rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kohuhu, kohuhu 'enana, kohuhu ika, kohuhu tai	kohuhu, kohuhu 'enata, kohuhu i'a	hora, 'ora, hoga
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	hora tahiti	hora tahiti
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
konini, konini tekeo, ko'u'u	hora	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Noms français

badamier, amandier du Pacifique

Noms anglais

tropical almond tree

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Forêt littorale, zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Terminalia catappa

Atteignant 40 m de haut et 2 m de diamètre, au port étagé ; feuilles alternes, simples, obovales, à base auriculée sur le pétiole, de 9 à 26 cm de long sur 6 à 18 cm de large, à marge entière ; fleurs par groupes de 20 à 40, longues de 3 à 5 mm, composées de 5 sépales blanc jaune et 10 étamines ; drupe ovoïde, dotée d'une aile de 4 à 10 cm de long sur 2 à 4 cm de large et 2 à 3 cm d'épaisseur, rouge à violette à maturité et comprenant une unique graine. Fruits consommés pour leur amande ; arbre d'ombrage dans les zones habitées, également employé en ébénisterie pour son bois.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun



NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
ma'i'i hao'e, ma'i'i kakauo'o	tai'e, koua'i'i hao'e	'autera'a, 'autara'a, taga'ige
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
pagoa	'autara'a, 'autera'a	'autara'a, 'autera'a, 'ava
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
moi	'autera'a, 'ava	'autera'a

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
'autera'a	'autera'a

Nom scientifique

Tithonia diversifolia

Astéracées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

tournesol mexicain

Noms anglais

tree marigold, Mexican sunflower

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, pistes agricoles et forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Tithonia diversifolia

Atteignant jusqu'à 5 m de haut avec une tige semi-ligneuse ; feuilles simples divisées en 3 à 5 lobes, de 8 à 15 cm de long sur 6 à 12 cm de large ; involucre de 1,5 à 2 cm de haut sur 2,8 cm de large ; 7 à 20 fleurs en languette par tête, les languettes jaunes longues de 3 à 6 cm ; nombreuses fleurs en tube de 15 mm de long ; akènes aplatis de 5 mm de long. Parfois employée comme engrais vert.

Oudart (2015), Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech.

SOURCES

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Rare	

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		tagia

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	tiare mahana	tiare mahana

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
---------	-----------------	---------------

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------





Noms français
huître végétale, rhoéo

Noms anglais
oyster lily

Type biologique
Herbacée

Statut biogéographique
Introduction moderne

Degré de naturalisation
Subspontanée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie
Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
		X	
MAI	JUN	JUL	AOU
		X	
SEP	OCT	NOV	DEC
	X	X	

Tradescantia spathacea

Plante en touffe atteignant 60 cm de haut ; feuilles engainantes à la base, charnues, lancéolées, vertes au-dessus, violettes en dessous, longues de 20 cm ; fleurs issues de spathes courtes, dotées de 3 pétales blancs et 6 étamines ; capsules comprenant 2 graines. Ornementale.

Nectar	Pollen	Miellat
	X	

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Peu commun	Peu commun

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Peu commun	Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre	Tuamotu Est





Noms français

tridax

Noms anglais

coat buttons

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Tridax procumbens

Atteignant 40 cm de haut ; feuilles longues de 2 à 7 cm sur 1 à 4 cm de large, ovales à lancéolées, trilobées ; têtes solitaires sur des pédoncules longs de 7 à 15 cm ; 3 à 6 fleurs en languette par tête, la languette jaune pâle à crème de 2,5 à 5 mm de long ; fleurs en tube jaune ; akène noir de 2 à 2,5 mm de long.

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Ramage (2019)


SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très rare	Rare	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Commun	Commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



Noms français

Triumfetta du littoral

Noms anglais

Beach Triumfetta

Type biologique

Liane rampante

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale, forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Triumfetta procumbens

Liane rampante atteignant plus de 6 m de long et moins de 40 cm de haut ; feuilles alternes, simples, largement ovales, le plus souvent divisées en 3 lobes, de 4 cm de long sur 4 cm de large, à marge dentée ; fleurs par groupes de moins d'une demi-douzaine, portant 5 pétales jaunes, de 7 à 10 mm de long ; capsule sphérique de 1,5 cm de diamètre, recouverte par plusieurs dizaines d'épines molles, comportant plus d'une dizaine de graines. Plante considérée médicinale dans certaines îles et dont l'écorce était autrefois employée comme cordage ou ligne de pêche.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Peu commun

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun Commun Commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Commun Commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

po'ue teatea, vavai
'ura vahine, mautere,
ha'aru'u vahine

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

urio piripiri motu

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

vavai vavai, urio vavai

Tuamotu Centre Tuamotu Est

vavai vavai



Nom scientifique

*Triumfetta
rhomboidea*

Malvacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

herbe à panier, hérisson
blanc

Noms anglais

Chinese bur, burbark

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones cultivées, zones
d'élevage bovin

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Triumfetta rhomboidea

Atteignant 2 à 3 m de haut ; feuilles simples, ovales, souvent trilobées sur 1,5 cm de long, à marge dentée ; inflorescences dépassant 20 cm de long, aux fleurs dotées de 5 sétales verts et 5 pétales jaunes ; capsule brune de 3 mm de diamètre, couverte d'épines permettant l'accrochage sur différentes surfaces.

Nectar Pollen Miellat

X X

Fert & Pajuelo (2013), Bull.Tech., Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Rare	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
puehu, puehu tai	pu'unehu, nehu, rehu, hopa, piripiri	piripiri, pipiri, pigipigi
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	piripiri	toteto
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
piripiri	piripiri	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

Nom scientifique

Turnera ulmifolia

Passifloracées

Synonymes

Taxons concernés

Noms français

turnera à feuilles d'orme

Noms anglais

yellow alder

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Adventice

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Turnera ulmifolia

Atteignant 1,5 m de haut, à la base de la tige ligneuse ; feuilles alternes, simples, elliptiques à ovales, crénelées, jusqu'à 15 cm de long ; fleurs solitaires dotées de 5 sépales verdâtres, de 5 pétales jaunes et de 5 étaminées ; capsules. Ornementale.

Nectar Pollen Miellat

X X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Rare Rare

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Peu commun Peu commun

Tuamotu Centre Tuamotu Est

Peu commun Peu commun

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

damiana

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est



Nom scientifique

Vachellia farnesiana

Fabacées

Synonymes

Acacia farnesiana

Taxons concernés



Noms français

mimosa de Farnèse,
bouquet, cassie jaune

Noms anglais

cassie, mimosa bush

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Menaçant

Statut UICN

Ecologie

Fourré sec, forêt sèche de
basse altitude

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	
MAI	JUN	JUL	AOU
SEP	OCT	NOV	DEC
		X	X

Vachellia farnesiana

Atteignant 4 m de hauteur, aux rameaux lisses portant de grandes épines et des sécrétions de gomme ; feuilles composées de 1 à 7 paires de pennes divisées chacune en 8 à 25 paires de folioles ; fleurs regroupées en inflorescences globuleuses orange et très odorantes ; gousses cylindriques de 2 à 8 cm de long.

Nectar Pollen Miellat

X X

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Peu commun Peu commun

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

puke puke, tumu ta'a

Rapa Iles du Vent Iles sous le Vent

Gambier Atolls soulevés Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre Tuamotu Est





Noms français

pois de mer

Noms anglais

beach pea, beach bean

Type biologique

Liane grimpante

Statut biogéographique

Indigène

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande littorale, forêt littorale

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Vigna marina

Liane grimpante dépassant 5 m de long ; feuilles trifoliées aux folioles ovales de 4 à 10 cm de long sur 3 à 8 cm de large ; inflorescences longues de 7 à 14 cm comprenant une dizaine de fleurs à corolle papilionacée jaune de 12 à 19 mm de long ; gousse noire à maturité, cylindrique légèrement courbée, de 4 à 8 cm de long sur 8 mm de diamètre. Parfois employée comme engrais vert.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Peu commun	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Peu commun	Commun	Commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Peu commun	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
		pipi taviri, pipi taetaevao, pipi tatahi, ave pipi, po'ue pipi
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
piti, po'ue	pipi tatahi	pipi tatahi, pipi motu, pipi ta'ero, pipi ra'au
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
pipi vao	pipi	pipi tatahi
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
pipi	pipi, pohue	

Nom scientifique

Waltheria indica

Malvacées

Synonymes

Waltheria americana

Taxons concernés



Noms français

waltheria

Noms anglais

sleepy morning

Type biologique

Arbrisseau

Statut biogéographique

Introduction polynésienne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Lande sèche, zones
habitées, zones cultivées

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Waltheria indica

Atteignant 2 m de haut ; feuilles blanchâtres en raison de l'importante pilosité, ovales, de 5 cm de long sur 2,5 de large, à marge dentée ; inflorescences longues de 10 à 16 cm ; fleurs à la corolle jaune se composant de 5 pétales longs de 3 mm ; capsule de 2,5 mm de long sur 1,6 mm de large.

Nectar Pollen Miellat

X X

Fert & Pajuelo (2013), Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Commun	Commun	Peu commun

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Rare	Rare

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
Rare	Rare

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
kaepu	pu'epu, pukepu	

Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
		toketo, toteto

Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
kovai 'iva		

Tuamotu Centre	Tuamotu Est
----------------	-------------



Nom scientifique

Waltheria tomentosa

Malvacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Waltheria polynésien

Noms anglais

Polynesian Waltheria

Type biologique

Arbuste

Statut biogéographique

Endémique de Polynésie

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC

Ecologie

Lande sèche, fourré sec, forêt sèche

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Waltheria tomentosa

Arbuste atteignant jusqu'à 4 m de haut et plus de 10 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, argentées, largement ovales, de 8 cm de long sur 7 cm de large, à marge dentée ; fleurs par groupes très compacts de plusieurs dizaines, portant 5 pétales jaunes, de 3 à 5 mm de long ; capsule obovoïde de 2,5 mm de long sur 1,5 mm de large, masquée par la corolle et le calice secs, comportant une unique graine.

Nectar Pollen Miellat

Butaud, obs. pers.

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Peu commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Très rare

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

kaepu

pukepu, makiha, pu'epu

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Weinmannia
spp.

Cunoniacées

Synonymes

Weinmannia parviflora

Taxons concernés

Weinmannia parviflora,
Weinmannia marquesana,
Weinmannia rapensis



Noms français

Weinmannia

Noms anglais

Weinmannia

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Endémique de la Société

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC - NT - VU

Ecologie

Forêt hygrophile de
moyenne et haute altitudes,
forêt de nuages

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Weinmannia spp.

Arbre atteignant 10 m de haut et 40 cm de diamètre ; feuilles opposées, simples ou composées de 3 à 5 folioles, ovales à elliptiques, de 3,5 à 7,5 cm de long sur 1,5 à 4 cm de large, à marge crénelée ; fleurs par groupe de plus d'une centaine de fleurs mâles et de fleurs femelles, dotées de 4 pétales blancs longs de 2 mm et de 8 étamines ; capsules obovales de 5 mm de long sur 1,5 mm de large, rouges à brunes à maturité, comprenant plusieurs graines.

Nectar Pollen Miellat

Rodgers (2017)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Commun

Commun

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Peu commun

Commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord

Marquises Sud

Australes Nord

ataku'a, ata

ataku'a, ata

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

'aito

'aito mou'a

'aito mou'a

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est



Nom scientifique

Xylosma suaveolens

Salicacées

Synonymes

Taxons concernés



Noms français

Xylosma polynésien

Noms anglais

East Polynesian Xylosma

Type biologique

Arbre

Statut biogéographique

Endémique de Polynésie

Degré de naturalisation

Statut réglementaire

Statut UICN

LC

Ecologie

Forêt littorale, forêt sèche, forêt mésophile de basse et moyenne altitudes, forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Xylosma suaveolens

Petit arbre atteignant 10 m de haut et 40 cm de diamètre ; feuilles alternes, simples, lancéolées à elliptiques, de 8 cm de long sur 4 cm de large, à marge crénelée ; fleurs mâles et fleurs femelles sur des pieds distincts ; fleurs par groupes d'une petite dizaine, longues d'environ 1 cm, comprenant 4 à 5 sépales vertâtres et de nombreuses étamines jaunes ou un unique stigmate ; baie ovoïde de 7-13 mm de long sur 5-8 mm de large, rouge à noire à maturité, comprenant 4 graines.

Nectar Pollen Miellat

Fert & Pajuelo (2013)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Très commun	Très commun	Peu commun
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Commun	Commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	Commun	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
pi'api'au	pi'api'au, 'au'e'eva	pine, 'oma'o, 'oma'o uava
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	pine	
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
	karaka, ramati'a	
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	



CHAMBRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE LAGONNAIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Noms français

Laiteron jaune

Noms anglais

Oriental false hawkbeard

Type biologique

Herbacée

Statut biogéographique

Introduction moderne

Degré de naturalisation

Naturalisée

Statut réglementaire

Statut UICN

Ecologie

Zones habitées, zones cultivées, pistes agricoles et forestières

MOIS DE FLORAISON

JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Youngia japonica

Herbe de moins de 50 cm ; feuilles en rosette basale, oblancéolées et lobées, de 2 à 20 cm de long sur 0,5 à 5 cm de large ; inflorescences regroupant plusieurs têtes aux involucre de 3,5 à 5 mm de haut ; fleurs en languette au nombre de 10 à 20 par têtes, les languettes longues de 3 à 4 mm, jaunes ; akènes bruns de 1,5 à 2,5 mm de long.

Nectar Pollen Miellat

X X

Ramage (2019)

SOURCES

ABONDANCE

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

Rare

Rare

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Rare

Peu commun

Peu commun

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Rare

Tuamotu Centre

Tuamotu Est

NOMS POLYNÉSIENS

Marquises Nord Marquises Sud Australes Nord

ma'a rapiti

Rapa

Iles du Vent

Iles sous le Vent

Gambier

Atolls soulevés

Tuamotu Ouest

Tuamotu Centre

Tuamotu Est





Noms français

zinnia

Noms anglais

touth-and-age, common zinnia

- Type biologique
- Herbacée
- Statut biogéographique
- Introduction moderne
- Degré de naturalisation
- Subspontanée
- Statut réglementaire
- Statut UICN
- Ecologie
- Zones habitées

MOIS DE FLORAISON			
JAN	FEV	MAR	AVR
X	X	X	X
MAI	JUN	JUL	AOU
X	X	X	X
SEP	OCT	NOV	DEC
X	X	X	X

Nectar	Pollen	Miellat
X	X	

Zinnia elegans

Atteignant 60 cm de haut ; feuilles sessiles de 3 à 8 cm de long sur 1,5 à 3,5 cm de large, lancéolées ; involucres hémisphériques de 2 à 3 cm de large sur 1 à 1,5 cm de haut ; fleurs en languette orange, violettes, pourpres, écarlates, jaunes ou blanches. Ornementale pour ses inflorescences.

Oudart (2015)

SOURCES

ABONDANCE		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rare	Rare	Rare
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
	Peu commun	Peu commun
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Rare	Peu commun	Peu commun
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	
Peu commun	Rare	

NOMS POLYNÉSIENS		
Marquises Nord	Marquises Sud	Australes Nord
Rapa	Iles du Vent	Iles sous le Vent
Gambier	Atolls soulevés	Tuamotu Ouest
Tuamotu Centre	Tuamotu Est	

